Porcino

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA

DAVETSA

2022 Catálogo DE PRODUCTOS

INDICE

DAVETSA 03

INYECTABLE
Dexavetsa 04
TNT Vetsa 05
Amoxifluvetsa G 06

SOLUCION ORAL
Coccivetsa 07
ElectroStar 08
Expectovetsa Plus 09

POLVO SOLUBLE
Sutrivetsa 600 10

LABORATORIO MEDIVAC 11

INYECTABLE
Parvoflyn 12

ORAL
Canaflox-T-360 13
Catarron C 14
Porcitak 15
Canavet 16
Engordabol 17

MIAVIT 18

PREMEZCLA
Miacid dry 19
Miabond BP 20

POLVO SOLUBLE
MiaClost 21

ORAL
Amino-vital plus 22
MiaFirstAid L 23
MiaKick 24
Amivit 25

LABORATORIO ZOTAL 26

Sanitas forte vet 27
Sanitas neozital 28
Preio sec 29
Previo quat 30
Previo saludine 31

LABORATORIO GISA 32

POLVO SOLUBLE
Amoxi Provet 500 33

SOLUCION ORAL
Fosfovet 20% 34
NorFlox 200 35

PREMEZCLAS
Clor T 36
Ivervet 0.6% 37

FlorVet 8% 38
Fosfo 20% 39
TiamuVet 10% 40
Tilmicosin 20% 41
Tiloplas 22% 42
Ericlor Expect 43
Thermotil Expect 44

VET SCIENCE 45

INYECTABLES
Adevet 46
Adevet + Fósforo 47
EnroVet Iny 10% 48
FluniVet Iny 50% 49
GentaVet Iny 100 50
IverVet Iny 1% 51
PhosVet B12 52
3-Streptopen G 53
Hierro-Forte 54
Diclon VS 55
Cetfiovet Iny 50 56
Levamivet B12 57
Vitavet Selenio + E 58
Oxivet Iny 10% 59
Tylogen VS 60
Tilmiflor Expecto Plus 61
Oxitocin Iny 20 62
Dipiron VS 63

MAGAPOR 64

Duragen 65
Vitasem 66
Higipal 67
Magacell 68
Simplybag 69
Hygitube 70
Semenbag y Smallbag 71
Magascan 72
Cámaras de conservación 73
Microscopios 74

KUBUS 75

Canula espiral con trasera 76
Conjunto post-cervical 77
Toallitas desinfectantes 78
Botellita descartable 79
Gel Lubricante Kubus 80

ROTECNA 81
Bebedero basculante maxi 82
Easy pan 83
Maxi hooper pan 84
Gow feeder 85
Wing R3 86
TR-4 87
Minitainer 88
Ni-2 movil 89
Piso destete 40*60 90
Piso destete 60*50 91
Piso destete 60*80 92
Piso destete 120*50 93
Pisos madre 94

Piso madre 40*60 95
Piso madre 60*80 96
Sow bowl 97
TR-2 98
Vallas PVC 99
Perfil T 100

CEVA 101

Circovac 102
Hyogen 103

HYPRA 104

SUISENG 105
ERYSENG PARVO LEPTO 106

SANFER 107

INYECTABLE
Amoxidex 108

LAPISA 109

Lapi-racto 110

MONTANA 111

Chuspisol 112

VEESURE 113

Lecisure 114
Herbosure - C 115

SILA 116

Benacid 350 Essential 117
Benbutyr 330 118

DAPASA NÚCLEOS 119

Núcleo para cerdos 120

SEPHNOS 121

Water Saver Plus 122
Turbo Pig 123
Dosificador semiautomático 124

OTROS EQUIPOS 125

Peletizadora de alimentos 126
Lampara Calentadora Infrarroja 127
Comedero semi-humedo 128
Calentador de Gas Catalítico 129
Comedero W/D GS100 130
Comedero destete 5 bocas 131

Jaulas de gestacion 132
Lampara de Calefacción ..... 133.
Sujetador de jaula 134
Pigglet Feeder 135
Racks de Castración 136
Aretes de identificación 137
Lamparas 138
Bebederos de Engorde y Lechon 139
Bebederos de Madres y Engorde 140
Comederos 141
Comederos de Maternidad 142
Comederos en Tolva 143
Comederos de lechon de plástico Virgen 144
Comederos de lechon de Acero Inoxidable 145
Sujetador de cerdos 146
Bisturí 147
Jeringa 148
Agujas 149
Crayones con rosca de cera 150
Areteador 151
Bolsa de recolección con filtro 152
Jaulas de maternidad 153
Descoladora de gas 154
Agujas Desechables 155
Descoladora Eléctrica 156

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA
DAVETSA

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA

DAVETSA

DEXAVETSA 0.2%

Solución Inyectable / Antiinflamatorio

Fórmula:
Cada 1 ml contiene:
Dexametasona 21 fosfato.....2.0 mg
Formaldehido.....0.001 mL
Monopropilenglicol.....0.4 mL
Agua Inyectable.....0.6 mL

INDICACIONES:

DEXAVETSA 0.2% es un potente antiinflamatorio esteroidal de rápida y larga acción elaborado con dexametasona e indicado para el tratamiento de procesos inflamatorios musculares, articulares y en los síndromes alérgicos en bovinos, porcinos, equinos, caninos y felinos.

DOSIS:

Bovinos productores de carne y leche, equinos: 2.5 a 10 mL de **DEXAVETSA 0.2%** por animal, (equivalente de 5 a 20 mg de dexametasona por animal), como dosis única al día.
Porcinos: 0.5 a 5 mL de **DEXAVETSA 0.2%** por animal, (equivalente de 1 a 10 mg de dexametasona por animal), una vez al día.
Caninos y felinos: 0.125 a 0.5 mL de **DEXAVETSA 0.2%** por animal, (equivalente de 0.25 a 1 mg de dexametasona por animal), como única dosis al día.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Intramuscular e intravenosa

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA
DAVETSA

TNT VETSA

Vitamínico reconstituyente y estimulante metabólico a base de fosforo orgánico.

Fórmula:
Cada 100 ml contiene:

Tiamina HCl	20 mg
Riboflavina 5 fosfato	10 mg
Nicotinamida	150 mg
Piridoxina HCl	20 mg
Cianocobalamina (Vitamina B12)	5 mg
Fósforo	1 g
Dextrosa anhidra	10 g
Cloruro de sodio	20 mg
Cloruro de potasio	20 mg
Borogluconato de magnesio	6 g
Borogluconato de calcio	25 g
Vehículo, c.b.p.	100.0 ml

INDICACIONES:

TNT-VETSA, es un suero energético y reconstituyente, indicado principalmente para el tratamiento y prevención de las deshidrataciones ocasionadas por vómito, diarrea, fiebre o trabajo en exceso, así como coadyuvante en el tratamiento de enfermedades infecciosas, parasitarias y metabólicas.

DOSIS:

- Bovinos: 500 mL
- Equinos: 200 -250 mL
- Ovinos, caprinos y porcinos: 50-125 mL
- Terneros, lechones y potros: 5-10 mL
- Pollos de engorda: 1-5 mL
- Caninos: 10 mL
- Felinos: 5 mL

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Intramuscular, subcutánea y endovenosa lenta.

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA
DAVETSA

AMOXIFLUVETSA G

Antibiótico de amplio espectro más antiinflamatorio

Fórmula:
Cada 1 mL contiene:
Amoxicilina trihidratada.....150.0 mg
Gentamicina sulfato.....40.0 mg
Flunixin meglumina.....11.0 mg
Vehículo cbp,.....1.0 mL



INDICACIONES:

AMOXIFLUVETSA G, es un antibiótico de amplio espectro, indicado para el tratamiento de infecciones respiratorias y digestivas que cursan con dolor e inflamación en bovinos, equinos, porcinos, pollos de engorda, caninos y felinos causadas por bacterias sensibles a la combinación de amoxicilina y gentamicina.

DOSIS:

- **Bovinos:** 2 mL de **Amoxifluvetsa G** por cada 25 kg de peso vivo, cada 24 h, durante 3 días consecutivos.
- **Equinos:** 1 mL de **Amoxifluvetsa G** por cada 10 a 20 kg de peso vivo, cada 24 h, durante 3 días consecutivos.
- **Porcinos:** 1 mL de **Amoxifluvetsa G** por cada 20 kg de peso vivo, cada 24 h, durante 3 días consecutivos.
- **Pollos de engorda, caninos y felinos:** 1 mL de **Amoxifluvetsa G** por cada 10 kg de peso vivo, cada 24 horas durante 2 días consecutivos.

VÍAS DE ADMINISTRACIÓN:

Intramuscular.

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA
DAVETSA

COCCIVETSA-1 AL 5%

Suspensión Oral / Coccidiostático

Fórmula:
Cada 100 mL contiene:

Toltrazuril	5.0 g
Carboximetilcelusosa (CMC)	0.5 g
Dextrosa anhidra	1.0 g
Benzoato de sodio	0.2 g
Saborizante vainilla hidrosoluble	0.005 mL
Colorante amarillo	0.001 g
Agua purificada	97.5 g

INDICACIONES:

COCCIVETSA-1 al 5% es eficaz para el tratamiento de coccidiosis en porcinos y bovinos. **COCCIVETSA-1 al 5%** actúa contra todas las eimerias e isosporas, citoisosporas y algunos protozooarios, como son: *Isospora suis, Eimeria debliecki. E. polita, E. spinosa, E. porci, E. neodebliecli, E. perminuta, E. suis, E. bovis y E. zuernii* principalmente.

DOSIS:

* **Porcinos:** 1 mL de COCCIVETSA-1 al 5% por cada 2.5 kg, equivalente a 20 mg de Toltrazuril por kg de peso vivo, dosis única.
* **Bovinos:** 1 mL de COCCIVETSA-1 al 5% por cada 3 kg, equivalente a 15 mg de Toltrazuril por kg de peso vivo, dosis única.

VÍAS DE ADMINISTRACIÓN:

Oral. Directo en la cavidad oral del animal.

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA
DAVETSA

ELECTRO STAR DAVETSA

Solución Oral / Vitamínico reconstituyente

FÓRMULA:
Cada 100 ml contienen:

Acetato de sodio	250.0 mg
Cloruro de calcio	15.0 mg
Cloruro de potasio	20.0 mg
Dextrosa anhidra	10.0 g
DL-fenilalanina	6.0 mg
DL-isoleucina	4.0 mg
DL-triptófano	1.0 mg
DL-valina	5.0 mg
D-pantenol	5.0 mg
Glutamato monosódico	4.0 mg
L-arginina clorhidrato	2.5 mg
L-cisteína clorhidrato	1.0 mg
L-histidina clorhidrato	1.0 mg
L-leucina	4.0 mg
L-lisina clorhidrato	3.0 mg
L-metionina	1.0 mg
L-treonina	2.0 mg
Nicotinamida	150.0 mg
Piridoxina clorhidrato	10.0 mg
Sulfato de magnesio	20.0 mg
Tiamina clorhidrato	20.0 mg
Vitamina B12 cianocobalamina	5000.0 mcg
Vitamina B2 (riboflavina 5 fosfato sódico)	4.0 mg
Benzoato de sodio	2.0 g
Colorante rojo fresa	0.01 g
Monopropilenglicol	40.0 ml
Agua purificada	58.5 ml

INDICACIONES:

ELECTRO STAR DAVETSA es un efectivo reconstituyente y rehidratante vitamínico indicado en casos de estrés, manejo excesivo y cambios en la alimentación. También está recomendado su uso en animales convalecientes o enfermos que han sufrido: vómito, deshidratación, diarrea y enfermedades crónicas los cuales requieren un aporte rápido de estos compuestos.

ESPECIES:

* **Aves y porcinos:** Administrar de 250 a 500 mL de **ELECTRO STAR DAVETSA** por cada 1000 L de agua de bebida, durante 3 a 7 días continuos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral mezclado diluido en el agua de bebida.

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA DAVETSA

EXPECTOVETSA PLUS

Solución Oral

FÓRMULA:
Cada 1000 mL contienen:
Bromhexina clorhidrato.....20.0 g
Guaifenesina.....10.0 g
Vehículo, c.b.p.....1000.0 mL

INDICACIONES:

EXPECTOVETSA PLUS expectorante indicado en el tratamiento de enfermedades respiratorias con secreciones mucosas en pollo de engorda y porcinos. Indicado como fluidificante de moco y descongestionante de las vías respiratorias.

DOSIS:

Pollos de engorda y porcinos: 0.5 a 1 L de **EXPECTOVETSA PLUS** por cada 1000 L de agua de bebida (equivalente a 4 mg de activo/kg de peso vivo) , durante 5 a 7 días consecutivos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral, diluido en el agua de bebida.

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA
DAVETSA

SUTRIVETSA 600

Polvo Soluble

FÓRMULA:
Cada 100 g contiene:
Sulfacloropiridazina Sodica.....50.0 g
Trimetoprim.....10.0 g
Excipiente, c.b.p.....100.0 g

INDICACIONES:

SUTRIVETSA 600 esta recomendado en el tratamiento de infecciones respiratorias y/o digestivas agudas en pollos de engorda y porcinos, así como de infecciones del tracto urogenital, salmonelosis, paratifoidea, shigellosis. Cuando la terapia antibacteriana está indicada para diarrea por *Escherichia coli* enterotoxigénica debe acompañarse con una terapia de reemplazo de fluidos y electrólitos. En el caso de **pollos de engorda y porcinos** se recomienda adicionar electrolitos en el agua de bebida. Dentro de los organismos comúnmente sensibles a la combinación del **SUTRIVETSA 600** se encuentran cocos gram positivos: *Staphylococcus aureus, Staphylococcus* spp, *Streptococcus pneumoniae.* Bacilos gram negativos tales como, *Haemophilus* spp, *Escherichia coli, Citrobacter* spp, *Klebsiella pneumoniae, Enterobacter cloacae, Enterobacter aerogenes, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Salmonella* spp, *Shigella* spp *Pasteurella* spp. *Pseudomonas* spp.

DOSIS:

Pollos de engorda y porcinos: 200 a 400 g de **SUTRIVETSA 600** por cada 1000 L de agua de bebida (equivalente a 24 mg de activo por kg de peso vivo), durante 5 a 7 días consecutivos.

VÍAS DE ADMINISTRACIÓN:

Oral, disuelto en el agua de bebida.

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA
DAVETSA

LABORATORIOS MEDIVAC



DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA
DAVETSA

PARVOFLYN

Inyectable

LABORATORIOS MEDIVAC

Fórmula:
Cada mL contiene:

Tilosina tartrato	200 mg
Gentamicina sulfato	60 mg
Dipirona sódica	250 mg
Clorfeniramida maleato	10 mg
Vehículo CSP	1 mL

INDICACIONES:

Parvoflyn combina dos antibióticos para el tratamiento de infecciones del tracto gastrointestinal, respiratorio, auxiliar en el tratamiento de parvovirus canino.

DOSIS:

* **Bovinos, porcinos, ovinos y caprino:** 1cc por cada 20 kg.
* **Caninos:** 1/2 ml 20 libras de peso, cada 24 horas de 3 – 5 días.
* **Pollos y pollitas:** 0.2 cc/ml por cada kg/2lbs de peso.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Subcutánea o intramuscular

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA
DAVETSA

CANAFLOX-T-360 1000 ML

LABORATORIOS MEDIVAC

Tilosina y f. fenicol / Oral

Fórmula:
Cada mL contiene:
Florfenicol.....40 mg
Tilosina.....110mg
Ácidoacetilsalicílico.....220mg
AmbroxolHCL.....10mg
Excipiente c.s.p.....1ml

INDICACIONES:
En aves en caso de cólera aviar, coriza infecciosa, enfermedad crónica respiratoria (micoplasma). Diarrea amarilla, verde y blanca. Use como auxiliar en caso de enfermedad de Newcastle (accidente) y soco. En cerdos; en caso de infecciones respiratorias, neumonía o neumonitis, diarrea color verde y amarillo.

DOSIS:
* **Aves de engorda y pollitas de reposición**: 1 ml por litro de agua de bebida proporciona. Durante un periodo de 5 a 8 días. Según la evaluación del médico veterinario.
* **Cerdos:** Se debe proporcionar de 1ml de Canaflox T360, por cada litro de agua de bebida durante 5 días. Según criterio del médico veterinario puede extenderse hasta 8 días.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Oral en el agua de bebida.

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA
DAVETSA

CATARRÓN C LITRO

Oral

LABORATORIOS MEDIVAC

Fórmula:
Cada 1cc contiene

Florfenicol	100 mg
Lincomicina	50 mg
Guayacol	25 mg
Ambroxol	5mg
Difenhidramina	5 mg
Dexametasona	0.125 mg
Vehículo csp	1cc



INDICACIONES:

Use en caso de peste, aviar, soco y accidente. Como auxiliar en caso de enfermedad respiratoria crónica y salmonella. Catarrón C, Interviene en mejorar la salud porque es antiinflamatorio, expectorante y mucolítica. Mejora la respiración y estimula la respuesta inmunitaria de aves y cerdos.

DOSIS:

1 cc por litro de agua de bebida por 5 días o una gota directa al pico por cada 2 libras de peso por 5 días.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA
DAVETSA

PORCITAK

Vitaminado

LABORATORIOS MEDIVAC

Fórmula:
Cada 100 g contiene:
Albendazol.....6 g
Ivermectina.....273mg
Vitamina B1 (Tiamina).....1 g
Excipientesc.p.s.....100g

INDICACIONES:
Porcitack Vitaminado es un antihelmíntico de administración oral que proporciona acción interna y externa, especialmente formulado para cerdos de todas las edades. Elimina parásitos gastrointestinales, pulmonares y parásitos externos tales como ácaros de sarna (sarcoptes scabel var suis), piojos (hematopinus suis) y garrapatas.

DOSIS:
* 1 g por cada 20 libras de peso vivo. Para garantizar la admnistración de 300 mcg de ivermectina y 6grs de albendazol por cada kg de peso vivo. Puede administrarse a cerdas gestantes, 21 días antes del parto, para evitar que los lechones se infesten de parásitos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Oral, mezclado en el alimento o diluido en el agua de bebida.

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA
EMDAVETSA

CANAVET

Suspensión Oral

LABORATORIOS MEDIVAC

Fórmula:
Cada 100 g contiene:

Caolin	10.0 g
Pectina	0.500 g
Sulfametosaxol	10.0 g
Trimetroprim	0.550 g
Neomicina	0.725 g
Homatroprima	0.010 g
Vehículo cbp	1 mL

INDICACIONES:
Antidiarreico oral en suspensión con tres antibióticos de alto espectro. Protector de la mucosa, solidifica las heces y absorbe las toxinas de alimento en mal estado. Contrarresta la diarrea infecciosa por E. Coli, salmonella spp streptococcus, auxiliar en la diarrea de parvovirus, en diarrea viral bovina IBR y TGI en cerdos.

DOSIS:
Perros y gatos 5 a 10 ml.
Ovinos y caprinos 10 a 30 ml.
Cerdos de 3 a 30 ml.
Vacunos y caballos de 60 a 120 ml.
Cada 12 horas, de 3 a 5 días.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Oral

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA
DAVETSA

ENGORDABOL

LABORATORIOS MEDIVAC

Anabólico en solución inyectable indicado en bovinos, equinos y porcinos.

Fórmula:
Cada ml contiene
Boldenona Undecilenato.....50 mg



INDICACIONES:
Coadyuvante en casos que se requiera promover la síntesis proteica en enfermedades de tipo debilitantes que produzcan pérdidas de peso, raquitismo o fracturas. Produce retención de nitrógeno, calcio, fósforo y potasio en balances negativos, contribuyendo a desarrollar una mayor masa muscular y un mejor crecimiento óseo.

Se utiliza como adyuvante en tratamiento postquirúrgico e intervenciones óseas luego de fracturas, para favorecer la formación del callo óseo. Estimula la formación de glóbulos rojos en procesos anémicos. Contribuye a aliviar los procesos de estrés ocasionado por destete precoz, castración o parasitismo.

DOSIS:
* **Bovinos, equinos, ovinos y porcinos:** 0.5 ml / 45 kg de peso vivo, cadaa 2-4 semanas.
* **Caninos:** 0.25 ml / 5 kg de peso vivo, cada 2-4 semanas.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Intramuscular profunda

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA DAVETSA

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA
DAVETSA

MIACID DRY NC

Premezcla

Aditivos por kg:
Formiato de calcio (E238)
Propionato de calcio (E282)
Soporte (sepiolita)

INDICACIONES:
Se utiliza en alimentación animal por su acción contra levaduras, bacterias como salmonella spp y escherichia con y antifúngico, por lo que colabora en higienización de fábricas. Conservación e higiene materias primas y piensos. Mejoran los procesos digestivos, aumentando la productividad y reduciendo la incidencia de diarreas, sobre todo en animales jóvenes y especialmente con cambios bruscos de alimento.

INGREDIENTES ACTIVOS:
Es una mezcla formiato de calcio y propionato de calcio 45% ácido fórmico equivalente 20% de ácido proplonico equivalente 0.6 grs. por litro de agua o 0.16 grs. por kg/pv.

DOSIFICACIÓN RECOMENDADA:
Para higiene de materias primas y pienso:
Materias primas y pienso (hasta 12% de humedad) 1-3 Kg/Tm Materias primas y pienso (hasta 12% de humedad) 3-6 Kg/Tm

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA DAVETSA

MIABOND BP

Oral

Aditivos por kg:
Mezcladecompuestosaromatizantes.....9.,625mg
Bentonita.....962,500 mg

INDICACIONES:
Producto indicado para la prevención y el tratamiento de intoxicaciones por Aflatoxinas. Fumonisina, T-2. Zearalenona y Ergotamina.

INDICACIONES DE USO:
Alta eficacia en la captación de aflatoxinas.
Poder adicional de captación de otras micotoxinas.
Reducción de la excreción de AFMl en la leche.
Apoyo salud hepática.
Mejora la granulación.

DOSIS:
0.5 a 1 kg por tonelada de alimento final.

EFICACIA:
Producto indicado para la prevención y el tratamiento de intoxicaciones por Aflatoxlnas, Fumonlslna. T-2. Zearalenona y Ergotamlna.

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA DAVETSA

MIACLOST

Premezcla

FÓRMULA:
Ingredientes por kilogramo:
Enterococcus faecium ..... 1500 x 109 CFU
Basillus subti/is ..... 50, 000 x 107 CFU
Sodio ..... 250, 000 mg
Vitamina C ..... 100, 000 mg

INDICACIONES:
Suplemento alimenticio con probióticos para lechones, pollos de engorde y pollitas para puesta, para estabilizar la microflora.

VENTAJAS:
Estabilización y regeneración de la flora intestinal, especialmente después del uso de antibióticos.
En caso de observar cambio de apariencia en las deposiciones o el estado de la cama.

DOSIS:
100 gr de Miaclost por cada 1000 litros de agua de bebida, durante 3 a 5 días.

AMINO-VITAL PLUS

Oral

INDICACIONES:
Optima combinación de vitaminas hidrosolubles y liposolubles y aminoácidos esenciales y no esenciales. Suplemento idóneo para animales sometidos a estrés térmico u otros factores que disminuyen el consumo de alimento. producto ideal para la recepción de pollitos de un día especialmente después de transportes largos. interrumpen procesos celulares y se altera la integridad de la membrana.

DOSIS:
500 - l ,OOOg Aminovital Plus por 1.000 litros de agua de bebida
(0.5-1 g/1). durante 5 - 7 días.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Administrar por via oral después de su disolución en el agua de bebida. En animales lactantes disolver en leche la dosis Indicada.

COMPOSICION:
Aislado de protefna de soja. cloruro de sodio, cloruro de potasio, bicarbonato de sodio, dextrosa, lactosa.

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA DAVETSA

MiaFirstAid L

Alivio rápido frente a problemas digestivos

INDICACIONES:

MiaFirstAid L es un suplemento alimenticio líquido para lechones que estabiliza el metabolismo digestivo y actúa como fuente de electrolitos.

- combinación de aromas y taninos, que proveen un efecto astringente a nivel intestinal
- contiene compuestos naturales altamente apetentes
- cómodo envase con dosificador para una fácil aplicación oral

El uso de MiaFirstAid L ha confirmado que incluso una sola dosis de 2 ml proporciona una mejor digestión y reduce la diarrea.

DOSIS

2 ml (1 pulsación) por lechón a partir del segundo día de vida, repetir si fuese necesario

PRESENTACION:

Caja de 12 botellas x 250 ml

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA DAVETSA

MiaKick

Oral

INDICACIONES:
Un suplemento líquido especialmente adaptado a los requerimientos de los lechones recién nacidos.

- Fuente especial de energía
- Probióticos
- Ácidos grasos de cadena media (AGCM)
- Inmunoglobulinas naturales de huevo
- Elevado contenido en vitaminas

OBJETIVOS
Efecto de la suplementación oral de MiaKick en el índice de mortalidad de lechones los 5 primeros día de vida

DOSIS:
2 ml (1 pulsación) inmediatamente tras el nacimiento.
Lechones débiles o con diarrea:
2 ml (1 pulsación) immediatamente tras el nacimiento + 2ml día 2.

AMIVIT

Para un arranque óptimo

INDICACIONES:

* Para un arranque ideal.
* En caso de elevadas necesidades nutritivas.
* Apoyo del metabolismo.

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN:

Pollitos: 1.0 – 2.0 l por cada 1,000 litros de agua de bebida durante 3 días.
Aves adultas: 1.0 l por cada 1,000 litros de agua de bebida durante 3 días.

COMPOSICIÓN:

Dextrosa, sorbitol, citrato de sodio, 1,2-propanodiol, proteína de soja hidrolizada, cloruro de sodio, cloruro de potasio.

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA
DAVETSA

ZOTAL®

LABORATORIOS

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA
DAVETSA

SANITAS FORTE VET

ZOTAL LABORATORIOS

Composición:
Glutaraldehído 14%
Didecildimetilclorurodeamonio.....10%
Excipiente c.s.p.....100%

INDICACIONES:

Desinfectante de última generación que combina dos principios activos que unidos ejercen una acción desinfectante de muy amplio espectro y a dosis de uso reducidas. Su excelente compatibilidad con todo tipo de materiales lo convierte en un producto versátil para la desinfección completa de naves, locales e instalaciones ganaderas, así como para la desinfección de medios de transporte de ganado, clínicas veterinarias, aulas y mataderos (área de estabulación de animales). También se encuentra autorizado su uso en la industria alimentaria.

DOSIFICACIÓN:

Rutinaria 0.2596
Normal 0.596
Estricta 1-296

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA DAVETSA

SANITAS NEOZITAL

Composición:
Ácido paracetico.....5%
Peróxido de hidrogeno.....25%
Excipiente c.s.p.....100%

INDICACIONES:
Desinfectante de uso ganadero de amplio espectro que gracias a su principio activo, el ácido peracético, proporciona una excelente capacidad de desinfección a concentraciones muy reducidas. Su fórmula es extremadamente potente, siendo capaz de eliminar bacterias, hongos y virus. Pero a la vez completamente biodegradable, por lo que no genera residuos potencialmente peligrosos para el medio ambiente. Sus dosis de uso van del 0'3 al 196.

DOSIFICACIÓN:
Rutinaria 0.396
Normal 0.596
Estricta 1 96

PREVIO SEC

INDICACIONES:
Previo-sec es un producto higienizante y secante a base de absorbentes minerales y vegetales con aceites esenciales destinado a las zonas de estabulación del ganado. Usando previo-sec de forma regular conseguimos un ambiente seco y sano con un elevado nivel de higienización. Favoreciendo el desarrollo productivo de los animales.

COMPOSICION:
Absorbentes minerales. Absorbentes vegetales. Aceites Esenciales

PREVIO QUAT

DETERGENTE ESPUMANTE CON AMONIO CUATERNARIO

Composición:

Tensioactivos no iónicos.....<5%
Tensioactivos anionicos.....<5%
Tensloactlvos anfotéricos.....<5%
Agentes secuestrantes.....<5%
Hidróxido sódico.....5-15%
Alquibencil di metil cloruro.....1%
Excipiente c.s.p.....10%

INDICACIONES:

Detergente concentrado alcalino espumante sin cloro destinado a la limpieza de instalaciones ganaderas e industria alimentaria, con gran capacidad de arrastre sobre la materia orgánica adherida en las superficies a tratar. En aplicaciones de espuma, usar equipo espumógeno a baja presión o lanza de espuma al 2%.

DOSIFICACIÓN:

Se usa entre el 0,5 y el 396

PREVIO SALUDINE

INDICACIONES:
Desinfectante de agua de bebida a base de peróxido de hidrógeno, especialmente indicado para aguas de consumo animal en explotaciones ganaderas. De alto poder oxidante y desinfectante, permite eliminar el biofilm e Impedir su reaparición, controlando de esta forma la aparición de diarreas. Inhibidor de la incrustación. Controla la corrosión. Cumple la norma UNE 902 para tratamiento de aguas de consumo para peróxidos de hidrógeno.

DOSIFICACIÓN:
Diluir en agua una proporción de 30-50 mi /rn3.

COMPOSICION:
Excipiente: c.s.p.....100%.
Peróxido de hidrógeno..... 50%

LABORATORIO GISA

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA
DAVETSA

AMOXI PROVET 500

Amoxicilina / Polvo Soluble

LABORATORIO GISA

Fórmula:
Cada 1000 g contienen:
Amoxicilina Trihidratada.....500.0 g
Excipiente cbp.....1000.0 g

INDICACIONES:

AMOXI PROVET 500 es un antibiótico de amplio espectro, está indicado para el tratamiento de infecciones respiratorias, digestivas en porcinos y pollos de engorde, causadas por bacterias sensibles a la Amoxicilina.

DOSIS:

* **Bovinos (becerros):** 350 g de Amoxi Provet 500 (175 ppm de Amoxicilina) por cada 1000 L de agua de bebida, equivalente a 8.8 mg de Amoxicilina, dos veces al día, durante 5 días continuos.
* **Porcinos:** 400 g de Amoxi Provet 500 (200 ppm de Amoxicilina) por cada 1000 L de agua de bebida, equivalente a 20 mg de Amoxicilina, cada 24 horas, durante 4 o 5 días continuos.
* **Pollos de engorda:** 100 a 200 g de Amoxi Provet 500 (50 a 100 ppm de Amoxicilina) por cada 1000 L de agua de bebida, equivalente de 10 a 20 mg de Amoxicilina, cada 24 horas, durante 3 a 5 días continuos.
* **Aves de postura:** 200 a 400 g de Amoxi Provet 500(100 a 200 ppm de Amoxicilina) por cada 1000 L de agua de bebida, equivalente de 10 a 20 mg de Amoxicilina, cada 24 horas, durante 3 a 5 días continuos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral, disuelto en agua de bebida.

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA DAVETSA

FOSFOVET 20%

Fosfomicina Sódica / Solución Oral

LABORATORIO GISA

Fórmula:
Cada 1000 mL contienen:
Fosfomicina sódica.....200.0 g
Vehículo cbp.....1000.0 g

INDICACIONES:

FosfoVet 20% es un antibiótico de amplio espectro, indicado para el tratamiento de infecciones respiratorias, digestivas en aves causadas por bacterias Gram positivas y Gran negativas sensibles a la Fosfomicina.

DOSIS:

Tratamiento curativo:

* **Aves:** 0.5 a 1 L de FosfoVet 20% (10 a 20 ppm)/1000 L de agua de bebida equivalente a 40 mg de Fosfomicina (kg de peso vivo de 3 a 5 días consecutivos.
* **Porcinos:** 1 a 2 L de FosfoVet 20% (20 a 40 ppm)/1000 L de agua de bebida equivalente a 30 mg de Fosfomicina/kg de 5 días consecutivos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral, diluido en el agua de bedida.

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA DAVETSA

NorFlox 200

Norfloxacina / Solución Oral

LABORATORIO GISA

Fórmula:
Cada 1000 mL contienen:
Norfloxacina.....200.0 g
Vehículo cbp.....1000.0 mL

INDICACIONES:
NorFLox 200 es un antibiótico de amplio espectro, que pertenece al grupo de las fluoroquinolonas de tercera generación, eficaz en el tratamiento de enfermedades respiratorias y digestivas causadas por bacterias Gram positivas y Gram negativas sensibles a la Norfloxacina.

DOSIS:
* **Pollos de engorda de 1 a 3 semanas de edad:** 15 mg de Norfloxacina/kg de peso vivo, equivalente a 250 mL de NorFLox 200 por cada 1000 L de agua de bebida (50 mg Norfloxacina/L), en intervalos de 24 horas, durante 3 a 5 días.
* **Pollos de engorda de 4 a 8 semanas de edad:** 15 mg de Norfloxacina/kg de peso vivo, equivalente a 500 mL de NorFLox 200 por cada 1000L de agua de bebida (100 mg Norfloxacina/L), en intervalos de 24 horas, durante 3 a 5 días.
* **Aves:** 15 mg de Norfloxacina/kg de peso vivo, equivalente de 0.25 a 0.5 L de NorFLox 200 por cada 1000L de agua de bebida (100 mg Norfloxacina/L), en intervalos de 24 horas, durante 3 a 5 días..

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Oral, diluido en el agua de bebida.

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA DAVETSA

CLOR T

Clortetraciclina y Tiamulina / Premezcla

LABORATORIO GISA

Fórmula:
Cada 1000 g contienen:
Clortetraciclina base.....150.0 g
Fumarato hidrogenado de Tiamulina.....50.0 g
Excipiente, cbp.....1000.0 g

INDICACIONES:
CLOR T es un antibiótico de amplio espectro, indicado para el tratamiento de infecciones respiratorias y digestivas en porcinos y aves causadas por bacterias sensibles a la combinación de Clortetraciclina con Tiamulina.

DOSIS:
* **Porcinos y aves:** 1 a 2 kg de CLOR T por tonelada de alimento (equivalente de 200 a 400 ppm), durante 7 a 14 días.

ESPECIES:
Porcinos y aves

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Oral, mezclado en el alimento.

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA DAVETSA

IVERVET 0.6%

Ivermectina / Premezcla

LABORATORIO GISA

Fórmula:
Cada 1000 g contienen:
Ivermectina .....6.0 g
Excipiente, cbp.....1000.0 g

INDICACIONES:

IVERVET 0.6% está indicado en el tratamiento de parásitos gastrointestinales, renales y pulmonares en sus fases larvarais y adultas, así como parásitos externos que afectan la salud y el desempeño de los porcinos como piojos y acaros de la sarna.

DOSIS:

* **En aves:** 180 a 720g de IVERVET 0.6% por tonelada de alimento (equivalen de 1.08 a 4.32 g de Ivermectina por tonelada de alimento) durante 3 a 7 días.
* **En porcinos de hasta 40 kg:** 333 g de IVERVET 0.6%, por tonelada de alimento (equivalente a 2 g de Ivermectina por tonelada de alimento), durante 7 días continuos.
* **En porcinos de 40 kg hasta 100 kg:** 400 g de IVERVET 0.6%, por tonelada de alimento (equivalente a 2.4 g de Ivermectina por tonelada de alimento, durante 7 días continuos.

ESPECIES:

Aves y porcinos

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral, mezclado en el alimento.

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA DAVETSA

FLORVET 8%

Florfenicol / Premezlca

LABORATORIO GISA

Fórmula:
Cada 1000 g contienen:
Florfenicol.....80.0 g
Excipiente cbp.....1000.0 g

INDICACIONES:

FlorVet 8% es un antibiótico de amplio espectro, indicado para el tratamiento de infecciones respiratorias, digestivas en porcinos y pollos de engorda, causadas por bacterias sensibles al Florfenicol.

DOSIS:

Tratamiento curativo:
Porcinos de engorda de 12 a 39 kg: 2.9 a 3.9 kg de FlorVet 8%/ tonelada de alimento equivalente de 15 mg de Florfenicol/kg de peso vivo, durante 3 a 5 días consecutivos.
Porcinos de engorda de 40 a 100 kg: 4.1 a 6.4 kg de FlorVet 8%/ tonelada de alimento equivalente de 15 mg de Florfenicol/kg de peso vivo, durante 3 a 5 días consecutivos.
Pollos de engorda de 1 a 3 semanas de edad: 1.7 a 2.7 kg de FlorVet 8%/ tonelada de alimento equivalente a 30 mg de Florfenicol/kg de peso vivo, durante 5 días consecutivos.
Pollos de engorda de 4 a 8 semanas de edad: 3.2 a 5.4 kg de FlorVet 8%/ tonelada de alimento equivalente a 30 mg de Florfenicol/ kg de peso vivo, durante 5 días consecutivos.
Gallina de postura: 0.5 a 1 kg de FlorVet 8%/ tonelada de alimento, durante 5 días consecutivos

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral, mezclado en el alimento.

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA DAVETSA

FOSFO 20%

Fosfomicina / Premezcla

LABORATORIO GISA

Fórmula:
Cada 1000 g contienen:
Fosfomicina sódica.....200.0 g
Vehículo, cbp.....100.0 mL

INDICACIONES:

FOSFO 20% está indicado en porcinos para el tratamiento del complejo respiratorio porcino (CRP), neumonías, pleuroneumonía porcina, rinitis atrófica, artritis bacterianas, erisipela, colibacilosis, salmonelosis y síndrome MMA. En aves es eficaz en el tratamiento de colibacilosis, aerosaculitis, enfermedad crónica respiratoria complicada (ERCC), salmonelosis, pasteurelosis, entre otras enfermedades causadas por bacterias sensibles a la Fosfomicina.

DOSIS:

* **Aves:** 0.5 a 1 kg de FOSFO 20% por tonelada de alimento, equivalente a 40 mg de Fosfomicina/kg de peso vivo de 3 a 5 días consecutivos.
* **Porcinos:** 1 a 2 kg FOSFO 20% por tonelada de alimento, equivalente a 30 mg de Fosfomicina/kg de 5 días consecutivos.

ESPECIES:

Aves y porcinos

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral, mezclado en el alimento.

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA DAVETSA

TiamuVet 10%

Fumarato Hidrogenado de Tiamulina/ Premezcla

LABORATORIO GISA

Fórmula:
Cada 1000 g contienen:
Fumarato Hidrogenado de Tiamulina.....100.0 g
Excipiente cbp.....1000.0 g

INDICACIONES:

TiamuVet 10% es un antibiótico de amplio espectro, indicado para el tratamiento de infecciones respiratorias y digestivas en porcinos causadas por bacterias sensibles a la Tiamulina.

DOSIS:

Porcinos, aves de engorda y postura.
Enfermedades respiratorias. Preventivo: 350 g de TiamuVet 10% (35 ppm de Tiamulina) por tonelada de alimento, hasta los 35 a 45 kg de peso vivo.
Curativo:1 a 2 kg de TiamuVet 10% (100 a 200 ppm de Tiamulina) por tonelada de alimento, cada 24 horas, durante 5 a 10 días continuos.
Enfermedades digestivas: 1 a 1.5 kg de TiamuVet 10% (100 a 150 ppm de Tiamulina) por tonelada de alimento, cada 24 horas, durante 5 a 10 días continuos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral, mezclado en el alimento.

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA DAVETSA

TILMICOSIN 20%

Tilmicosina fosfato / Premezcla

LABORATORIO GISA

Fórmula:
Cada 1000 g contienen:
Tilmicosina fosfato.....200.0 g
Excipiente cbp.....1000.0 g

INDICACIONES:

Tilmicosin 20% es un antibiótico macrólido de amplio espectro indicado en el tratamiento de infecciones respiratorias en porcinos causadas por bacterias sensibles a la Tilmicosina como: Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae y Mycoplasma spp.

DOSIS:

* **Porcinos:** 1 a 2 kg de Tilmicosin 20% por tonelada de alimento (equivalente de 200 a 400 ppm), equivalente de 8 a 16 mg de Tilmicosina por kg de peso vivo, durante 15 días
* **Aves:** 350 a 500 g de Tilmicosin 20% por tonelada de alimento (equivalente de 70 a 100 ppm), durante 5 días continuos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral, mezclado en el alimento.

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA DAVETSA

TILOPLAS 22%

Tilosina fosfato / Premezcla

LABORATORIO GISA

Fórmula:
Cada 1000 g contienen:
Tilosina fosfato.....220.0 g
Excipiente cbp.....1000.0 g

INDICACIONES:

TILOPLAS 22% antibiótico efectivo en el tratamiento de enfermedades causadas por bacterias Gram positivas y alguna Gram negativas incluyendo Mycoplasma spp. En porcinos es efectivo en casos de ileítis, enteropatías proliferativas porcinas (EPP) complejo respiratorio porcino (CRP) y neumonía enzoótica. En aves está indicado para el tratamiento de la enfermedad respiratoria crónica (ERC).

DOSIS:

* **Porcinos:** 182 a 455 de TILOPLAS 22% (40 a 100 ppm de Tilosina fosfato) por tonelada de alimento, durante 3 semanas.
* Aves: ERC ocasionada por Mycoplasma 4 a 5 kg de TILOPLAS 22% (800 a 1000 ppm de Tilosina fosfato) por tonelada de alimento, como dosis única en pollos de 0 a 5 días de edad, seguido de una segunda administración en el alimento durante 24 a 48 horas entre la 3º y 5º semana de edad.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral, mezclado en el alimento.

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA DAVETSA

ERICLOR EXPECT

Premezcla

LABORATORIO GISA

Fórmula:
Cada 1000 g contienen:
Clortetraciclina base.....170.0 g
Eritromicina tiocianato.....100.0 g
Bromhexina HCl.....50.0 g
Butilhidroxitolueno (BHT).....3.0 g
Acemite de trigo.....677.0 g

INDICACIONES:

ERICLOR EXPECT en **porcinos** es efectivo contra bacterias primarias y secundarias que interactúan en el complejo respiratorio porcino (CRP) como *Mycoplasma hyopneumoniae, Actinobacillus pleuropneumoniae, Streptococcus suis* y *Haemophilus parasuis*, siendo además efectivo en el tratamiento de pasteurelosis. En **aves** es eficaz en el tratamiento de enfermedades infecciosas causadas principalmente por *Mycoplasma* spp, *Staphylococcus* spp, *Pasteurella multocida*, entre otras bacterias sensibles a la combinación de Eritromicina y Clortetraciclina.

DOSIS:

* **Aves de engorda y porcinos:** 1 a 2 kg de **ERICLOR EXPECT** por tonelada de alimento (equivalente de 100 a 200 ppm de Eritromicina + 170 a 340 ppm de Clortetraciclina + 50 a 100 ppm de Bromhexina HCl) durante 7 días continuos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral, mezclado en el alimento.

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA DAVETSA

THERMOTIL EXPECT

Polvo Soluble

LABORATORIO GISA

Fórmula:
Cada 1000 g contienen:

Amoxicilina trihidratada	250.0 g
Tilmicosina fosfato	100.0 g
Acetaminofén	250.0 g
Bromhexina HCl	50.0 g
Dextrosa anihidra	150.0 g
Citrato de sodio	195.0 g
Ácido etilendiaminotetraacético (EDTA)	5.0 g

INDICACIONES:

THERMO EXPECT es efectivo en el tratamiento de enfermedades respiratorias agudas o crónicas que cursen con moco denso y en su retención, así como en trastornos infecciosos con presencia de secreción mucopurulenta. En **porcinos** es efectivo principalmente en infecciones respiratorias causadas por *Mycoplasma hyopneumoniae, Actinobacillus pleuropneumoniae, Streptococcus suis* y *Haemophilus parasuis*. En aves es eficaz en casos de micoplasmosis aviar y sinovitis causada principalmente por *Mycoplasma* spp, además es efectivo contra *Staphylococcus* spp, Pasteurella multocida, entre otras bacterias sensibles.

DOSIS:

* **Porcinos:** 400 g de **THERMO EXPECT** por cada 1000 L de agua de bebida o 800 g de **THERMO EXPECT** por cada 1000 kg de alimento, equivalente a 20 mg de Amoxicilina kg/peso vivo, durante 4 o 5 días continuos.
* **Pollos de engorda:** 100 a 200 g de **THERMO EXPECT** por cada 1000 L de agua de bebida o de 200 a 400 g de **THERMO EXPECT** por cada 1000 kg de alimento, equivalente de 10 a 20 mg de Amoxicilina, durante 3 a 5 días continuos.
* **Aves de postura:** 200 a 400 g de **THERMO EXPECT** por cada 1000 L de agua de bebida o de 400 a 800 g de **THERMO EXPECT** por cada 1000 kg de alimento, equivalente de 10 a 20 mg de Amoxicilina, durante 3 a 5 días continuos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral, disuelto en el agua de bebida o mezclado en el alimento.

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA DAVETSA

VetScience®

LABORATORIOS

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA

DAVETSA

AdeVet

Vitamina A, D y E / Solución Inyectable

Fórmula:
Cada 5 mL contienen:

Vitamina A	500 000.0 UI
Vitamina D	75 000.0 UI
Vitamina E	50.0 UI
Vehículo, cbp	5.0 mL

INDICACIONES:

AdeVet está indicado para tratar la carencia de las vitaminas A, D3 y E en general. En hembras y machos reduce los problemas de infertilidad y favorece a los machos al inicio de la engorda. Puede administrarse, como coadyuvante en el tratamiento de enfermedades infecciosas, vacunaciones o desparasitaciones.

DOSIS:

* **Bovinos (productores de carne y leche) y equinos:** Administrar de 3 a 6 mL de AdeVet.
* **Porcinos, ovinos, caprinos, becerros y potros**: Administrar de 2 a 3 mL de AdeVet.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Intramuscular.

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA DAVETSA

ADEVET + FÓSFORO

Solución Inyectable

Fórmula:

Cada 1 mL contiene:

Vitamina A	500 000.0 UI
Vitamina D	75 000.0 UI
Vitamina E	50.0 UI
Fósforo	1.56 mg
Vehículo c.b.p.	1.0 mL.

INDICACIONES:

ADEVET + FÓSFORO está indicado para tratar la carencia de las vitaminas A, D3, E y Fósforo en general. En hembras y machos reduce los problemas de infertilidad y favorece a los machos al inicio de la engorda. Puede administrarse, como coadyuvante en el tratamiento de enfermedades infecciosas, vacunaciones o desparasitaciones.

DOSIS:

*__Bovinos productores de carne:__ Administrar de 4 a 6 mL de **ADEVET + FÓSFORO.**

*__Porcinos, ovinos, caprinos y becerros:__ Administrar de 2 a 3 mL de **ADEVET + FÓSFORO.**

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Intramuscular.

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA DAVETSA

EnroVet Iny 10%

Enrofloxacina / Solución Inyectable

Fórmula:
Cada 1 mL contiene:
Enrofloxacina.....100.0 mg
Vehículo, cbp.....1.0 mL

INDICACIONES:

ENROVET INY 10% es un antibiótico eficaz contra bacterias Gram (+): Staphylococcus spp, Streptococcus suis, Gram (-): Enterobacteriaceae, Pasteurella multocida, E. coli, Mannheimia haemolytica, Histophilus somni, Chlamydophila felis, Rickettsia, Actinobacillus pleuropneumoniae, Haemophilus parasuis, Klebsiella pneumoniae y Mycoplasma spp, indicado para el tratamiento de infecciones respiratorias y digestivas causadas por bacterias sensibles a la Enrofloxacina.

DOSIS:

* **Bovinos productores de carne, equinos, porcinos:** 2 mL por cada 40 kg de peso (equivalente a 5 mg de Enrofloxacina base por kg de peso vivo), cada 24 h, durante 3 a 5 días.
* **Caninos y felinos:** 0.25 mL por cada 5 kg de peso (equivalente a 5 mg de Enrofloxacina por kg de peso vivo) cada 24 h, durante 5 días.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Bovinos productores de carne: Subcutánea.
Equinos: Intravenosa e intramuscular.
Porcinos: Intramuscular.
Caninos: Intramuscular e intravenosa.
Felinos: Intramuscular.

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA DAVETSA

FluniVet Iny 50

Flunixin meglumina / Solución Inyectable

Fórmula:
Cada 1 mL contienen:
Flunixin meglumina..... 50.0 mg
Vehículo, cbp.....1.0 mL

INDICACIONES:
FluniVet Iny 50 está indicado en bovinos como coadyuvante en el tratamiento de mastitis aguda, trastornos respiratorios, procesos inflamatorios con alteraciones músculo esqueléticas, heridas y dolor postquirúrgico, dolor abdominal, diarreas neonatales en becerros, control de la pirexia asociada con el complejo respiratorio bovino (CRB) y endotoxemia, además se recomienda para la enfermedad respiratoria aguda, mastitis aguda por coliformes con choque endotóxico y dolor agudo (síndrome de la vaca caída). En equinos es auxiliar en trastornos músculo esqueléticos (miositis, tendinitis, sinovitis y artritis), dolor visceral (cólico), diarreas en potrillos, endotoxemia, enfermedad respiratoria aguda, colitis, laminitis, heridas y dolor post-quirúrgico. En porcinos ayuda en el tratamiento del síndrome MMA (Mastitis, Metritis, Agalactia), neumonía, artritis e inflamaciones de origen traumático. En caninos y felinos es eficaz para el tratamiento de la inflamación y el dolor asociado a padecimientos respiratorios, músculo esqueléticos y diferentes cuadros que cursan con dolor agudo.

DOSIS:
* **Bovinos:** 4.4 mL de FluniVet Iny 50 por cada 100 kg de peso vivo, equivalente a 2.2 mg de Flunixin/kg. Repetir si es necesario a intervalos de 24 horas, pero no por más de 5 días.
* **Equinos:** En dolores viscerales asociados al cólico, se recomienda de 0.22 a 0.44 mL de FluniVet Iny 50 por cada 10 kg de peso vivo, equivalente de 1.1 a 2.2 mg de Flunixin/kg, por vía intravenosa al iniciarse la signología. El tratamiento puede ser repetido 1 ó 2 veces si reaparecen los signos cada 24 horas. En inflamaciones y dolores asociados con alteraciones músculo esqueléticas, se recomienda 0.22 mL de FluniVet Iny 50 por cada 10 kg de peso vivo, equivalente a 1.1 mg de Flunixin/kg, por vía intramuscular o intravenosa, cada 24 horas, pero no por más de 5 días.
* **Porcinos:** 1 a 2 mL de FluniVet Iny 50 por cada 45 kg de peso vivo, equivalente de 1.1 a 2.2 mg de Flunixin kg, cada 24 horas, durante 3 a 5 días continuos.
* **Caninos y felinos:** 0.025 a 0.1 mL de FluniVet Iny 50 por cada 5 kg de peso vivo, equivalente de 0.25 a 1.1 mg de Flunixin/kg, cada 24 horas, durante 3 a 5 días continuos

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Bovinos, equinos, porcinos y caninos: intravenosa o intramuscular.
Felinos: subcutánea

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA DAVETSA

GentaVet Iny 100

Gentamicina / Solución Inyectable

Fórmula:
Cada 1 mL contiene:
Gentamicina sulfato.....100.0 mg
Vehículo, cbp.....1.0 mL

INDICACIONES:

GENTAVET INY 100 es un antibiótico eficaz contra bacterias Gram (-): E. coli, Klebsiella spp, Proteus spp, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella spp, Enterobacter spp, Haemophilus spp, Serratia spp, Shigella spp, Actinobacillus spp y Mycoplasma spp, indicado para el tratamiento de infecciones respiratorias y digestivas causadas por bacterias sensibles a la Gentamicina.

DOSIS:

* **Bovinos productores de carne:** 4.4 a 6.6 mL por cada 100 kg de peso (equivalente de 4.4 a 6.6 mg de Gentamicina sulfato por kg de peso vivo), cada 24 h, durante 3 a 5 días.
* **Equinos:** 6.6 mL por cada 100 kg de peso (equivalente a 6.6 mg de Gentamicina sulfato por kg de peso vivo), cada 24 h, durante 3 a 5 días
* **Porcinos:** 1 mL por cada 20 kg de peso (equivalente a 5 mg de Gentamicina sulfato por kg de peso vivo), cada 24 h, durante 3 a 5 días.
* **Caninos:** 0.45 a 0.70 mL por cada 5 kg de peso (equivalente de 9 a 14 mg de Gentamicina sulfato por kg de peso vivo), cada 24 h, durante 3 a 5 días.
* **Felinos:** 0.25 a 0.40 mL por cada 5 kg de peso (equivalente de 5 a 8 mg de Gentamicina sulfato por kg de peso vivo), cada 24 h, durante 3 a 5 días.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Equinos, caninos y felinos: Intramuscular o intravenosa.
Bovinos productores de carne y porcinos: Intramuscular.

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA DAVETSA

IverVet Iny 1%

Ivermectina / Solución Inyectable

Fórmula:
Cada 1 mL contiene:
Ivermectina.....10.0 mg
Vehículo, cbp..... 1.0 mL

INDICACIONES:

IVERVET INY 1% es una solución inyectable estéril, efectiva para el control y tratamiento contraparásitos internos en estados larvarios y adultos, así como los parásitos externos en bovinos, ovinos, porcinos, caprinos y caninos con una sola aplicación; presentando un amplio margen de seguridad en todas las especies antes mencionadas.
IVERVET INY 1% está indicado para el tratamiento contra los siguientes parásitos: Parásitos gastrointestinales: Ascaris summ, Hyostrongylus rubidus, Oesophagostomum spp, Strongyloides ransomi y Ancylostoma spp. Parásitos pulmonares: Metastrongylus spp. Parásitos del riñón: Stephanurus dentatus, Trichuris suis. Piojos: Haematopinus suis. Ácaros de la sarna: Sarcoptes scabiei var. suis, Otodectes cynotis, Sarcoptes scabiei, Cheyletiella yasguri, Cheyletiella parasitovorax, Cheyletiella blakei, Pneumonyssus caninum.

DOSIS:

* **Bovinos productores de carne, ovinos y caprinos:** 1 mL por cada 50 kg de peso vivo (200 µg/kg de peso vivo), administración única.
* **Porcinos:** 1 mL por cada 33 kg de peso vivo (300 µg/kg de peso vivo), administración única.
* **Caninos:** 0.1 mL a 0.2 mL por cada 5 kg de peso vivo (200 a 400 µg/kg de peso vivo), administración única.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Subcutánea exclusivamente.

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA DAVETSA

PhosVet B12

Ácido fosfonoso / Solución Inyectable

Fórmula:

Cada 1 mL contienen:

Ácido fosfonoso [1-(n-butilamino)-1-metiletil] (Butafosfán).100.0 mg

Vitamina B12 (cianocobalamina).....50.0 µg

Vehículo, cbp.....1.0 mL

INDICACIONES:

PhosVet B12 está indicado en el tratamiento de enfermedades crónicas y es eficaz en la protección del hígado, el metabolismo corporal y la formación de glóbulos rojos.

DOSIS:

* **Bovinos productores de carne, bovinos productores de leche y equinos adultos:** 1000 a 2000 mg de butafosfán/kg + 0.5 a 1 mg de Vitamina B12/kg (equivalente de 10 a 20 mL).
    - •En vacas en el postparto de 1 a 2 veces por semana, cada 2 a 3 días, hasta por 6 semanas.
    - •En caballos deportivos, cada 2 a 3 días, hasta por 14 días.
    - •Potros y terneros: 500 a 1200 mg de butafosfán/kg + 0.25 a 0.6 mg de Vitamina B12/kg (equivalente de 5 a 12 mL).
    - •En terneros con desarrollo deficiente, hasta dos veces por semana.
* **Ovinos y caprinos adultos:** 250 a 500 mg de butafosfán/kg + 0.125 a 0.25 mg de Vitamina B12/kg (equivalente de 2.5 a 5 mL).
    - * Corderos y cabritos: 150 a 250 mg de butafosfán/kg + 0.075 a 0.125 mg de Vitamina B12/kg (equivalente de 1.5 a 2.5 mL).
    - •En corderos y cabritos con desarrollo deficiente, hasta dos veces por semana.
* **Porcinos:** 250 a 1000 mg de butafosfán/kg + 0.125 a 0.5 mg de Vitamina B12/kg (equivalente de 2.5 a 10 mL). En el síndrome MMA.
* **Lechones:** 100 a 250 mg de butafosfán/kg + 0.05 a 0.125 mg de Vitamina B12/kg (equivalente de 1 a 2.5 mL), al destete y al inicio de la engorda.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Intramuscular, subcutánea o endovenosa. Puede mezclarse con suero glucosado o soluciones de calcio.

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA DAVETSA

3-Streptopen G

Penicilina / Solución Inyectable

Fórmula:
Cada 1 mL contiene:
Penicilina G Potásica.....25 000 UI
Penicilina G Procaínica.....75 000 UI
Penicilina Benzatínica.....100 000 UI
Dihidroestreptomicina sulfato.....200 mg
Vehículo, c.b.p.....1 mL

INDICACIONES:
3-Streptopen G indicado para el tratamiento de procesos infecciosos causados por neumonías bacterianas, síndrome MMA (mastitis, metritis, agalactia), infecciones puerperales, clostridiasis, erisipela, heridas infectadas, tratamiento post-operatorio y enfermedades causadas por bacterias sensibles a las penicilinas en combinación con la dihidroestreptomicina.

DOSIS:
Bovinos (productores de carne y leche) y porcinos: 1 mL de 3-Streptopen G por cada 10 a 20 kg de peso vivo, equivalente a 10,000 UI/kg y 20,000 UI/kg de penicilinas, repetir a las 72 horas si es necesario.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Intramuscular profunda.

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA DAVETSA

Hierro-Forte

Hierro dextrán / Solución Inyectable

Fórmula:
Cada 1 mL contiene:

Hierro dextrán	200 mg
Cobalto	10 mcg
Zinc	0.5 mg
Vitamina B12 (cianocobalamina)	10 mcg
Vehículo c.b.p.	1 mL

INDICACIONES:

Hierro-Forte es eficaz para el tratamiento y prevención de anemias generadas por deficiencias de hierro derivadas de desnutrición, parasitosis, convalecencias, hemorragias, estados que impliquen compromiso de glóbulos rojos y en animales de alto desempeño.

DOSIS:

* **Bovinos:** 0.02 a 0.04 mg de hierro dextrán/kg, equivalentes de 1 a 2 mL de Hierro-Forte/100 kg de peso vivo, en bovinos con anemia, animales de alto desempeño o convalecientes.
* **Becerros:** 5 mL de Hierro-Forte/animal, la primera, cuarta y sexta semana de edad.
* **Ovinos y caprinos:** 0.05 mg de Hierro dextrán/kg, equivalente a 2.5 mL de Hierro-Forte/animal, entre la primera y tercera semana de edad.
* **Porcinos (lechones):** 200 mg de hierro dextrán/lechón, equivalente a 1 mL de Hierro-Forte, el tercer día de nacidos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Intramuscular profunda.

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA DAVETSA

Diclon VS

Diclofenaco sódico / Solución Inyectable

Fórmula:
Cada 1 mL contiene:
Diclofenaco sódico.....50 mg
Vehículo cbp.....1 mL

INDICACIONES:

Diclon VS está indicado como coadyuvante en enfermedades donde hay inflamación, fiebre y dolor.

DOSIS:

⋆ **Bovinos y Porcinos:** 1-2.5 mg diclofenaco/kg, equivalentes de 1 a 2.5 ml de DICLON VS /50 kg de peso vivo, cada 24 horas, de 1 a 3 días continuos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Intramuscular profunda.

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA DAVETSA

CEFTIO VET INY 50

Suspensión Oral

Fórmula:
Cada 1 ml contiene:
Certiofur clorhidrato ..... .50.0 mg
Vehículo cbp ..... 1.0 mL

INDICACIONES:

Es un antibiótico de amplio espectro con actividad bactericida. Indicado para el tratamiento de las siguientes enfermedades. En bovinos, para el tratamiento de infecciones respiratorias (fiebre de embarque y CRB), infecciones podales, infecciones de la glándula mamaria (Mastitis aguda y crónica), infecciones oculares, infecciones genitourinarias (fiebre puerpal y metritis aguda y crónica) y clostridiasis en porcinos, para el tratamiento de infecciones respiratorias (neumonía bacteriana), infecciones articulares (septicemia, poliartritis y poliserositis) e infecciones uterinas (síndrome MMA). En equinos, para el tratamiento de infecciones respiratorias y reproductivas. En caninos, felinos, ovinos y caprinos, para el tratamiento de enfermedades del tracto respiratorio.

DOSIS:

- **Bovinos productores de carne y productores de leche**: 1 a 2 mL por cada 50 kg de peso vivo (1.1 a 2.2 mg/kg de peso vivo), una vez al día durante 3 días.
- **Equinos, Ovinos y Caprinos:** 1 mL por cada 25 kg de peso vivo (2.2 mg/kg de peso vivo), una vez al día durante 3 a 5 días.
- **Porcinos:** 1.5 a 2.5 mL por cada 25 kg de peso vivo (3 a 5 mg/kg de peso vivo) una vez al día durante 3 a 5 días.
- **Caninos y felinos:** 0.2 a 0.4 mL por cada 5 kg de peso vivo (2.2 a 4.4 mg/kg de peso vivo), una vez al día durante 3 a 5 días.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Intramuscular o subcutánea.

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA DAVETSA

LEVAM IVET 812

Solución Inyectable

Fórmula:

Cada 1 mL contiene:

Levamisol clorhidrato .....120 mg

Vitamina B12 (cianocobalamina).....100 mcg

Vehículo, cbp.....1 mL

INDICACIONES:

Está indicado para el tratamiento de las parasitosis pulmonares y gastrointestinales de los bovinos, porcinos, ovinos y caprinos, eliminando formas adultas y larvarias. Adicionado con vitamina B12, que coadyuva en el tratamiento y recuperación.

DOSIS:

1 ml por cada 20 kg de peso vivo (equivalente a 6 mg de levamisol clorhidrato + 5 mcg de cianocobalamina/kg de p.v.). como aplicación única.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Intramuscular profunda.

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA DAVETSA

VITAVET SELENIO+ E

Solución Inyectable

Fórmula:
Cada 1 ml contiene:

Selenita sódico	11,000 mcg
Vitamina E Tocoferol.	80,000 mcg
Fósforo	1,560 mcg
Vehículo cbp	1.0 ml

INDICACIONES:
Para la prevención y tratamiento de las deficiencias de vitamina E y selenio, fórmula adicionada con fósforo para mantenimiento. Es un potente antioxidante, evita la formación de peróxidos nocivos a las células. Previene las enfermedades infecciosas y como auxiliar en profilaxis de algunas infecciones como síndrome miopático, disnea, síndrome de la vaca caída, enfermedad del músculo blanco, problemas locomotores crónicos, retención placentaria, esterilidad, abortos, partos prematuros y enteritis diarreica entre otros padecimientos.

DOSIS:
1 ml por cada 50 kilos de peso corporal.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Iintramuscular o subcutánea.

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA
DAVETSA

OXIVET INY 10%

Solución Inyectable

Fórmula:
Cada 1 ml contiene:
Oxitetraciclina .....100.0 ml
Vehículo cbp .....1.0 ml

INDICACIONES:
En un antibiótico bacteriostático de amplio espectro, efectivo contra bacterias Gram positivas (Actinomyces spp, Bacillus anthracis, Clostridium spp, Corynebacterium spp, Erysipelothrix rhusiopatiae, Listeria spp, Sthaphylococcus spp, Streptococcus spp) y Gram negativas (Actinobacillus spp, Bordetella spp, Bruce/la spp, Campylobacter spp, Escherichia coli, Fusobacterium necrophorus. Haemophilus spp, Klebsiella spp, Leptospira spp, Oraxe//a bovis, Pasteurella spp, Salmonella spp, Shigella spp) Además actúa contra Chlamydia spp, Micoplasma spp, Anaplasma spp y Coxiella burnetti, porcino, ovino, equino y caprino.

DOSIS:
En todas las especies de destino (blanco) administrar 1 ml de oxivet iny 10% tratan 10kg de peso, equivalente a 10 mg - 20 mg de oxitetraciclina por un kilogramo de peso.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Intramuscular o intravenosa.

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA DAVETSA

TYLOGEN VS

Solución Inyectable

Fórmula:
Cada 1 ml contiene:
Tilosina tartrato ..... 200 mg
Gentamicina sulfato ..... 100 mg
Vehículo cbp ..... 1.0 ml

INDICACIONES:
Tylogen VS es un antibiótico indicado para el tratamiento de infecciones respiratorias y digestivas causadas por bacterias sensibles a la combinación de tilosina con gentamicina.

DOSIS:
• Aves: 0.25 ml por kg de peso vivo, equivalente a 50 mg de tilosina tartrato + 25 mg de gentamicina sulfato/kg de peso vivo, cada 24 horas, durante 3 a 5 dias continuos.
• Porcinos (hasta 3 días de nacidos): tratamiento de colibacilosis por E. coli y neumonías por Pasteurella spp: 0.25 mL de TyloGen VS por cada 5 kg de peso vivo, equivalente a 10 mg deTilosina tartrato + 5 mg de Gentamicina sulfato/kg de peso vivo, cada 24 horas, durante 3 a 5 días continuos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Intramuscular

Tilmiflor Expecto Plus

Solución Inyectable

Fórmula:
Cada 1 ml contiene:

Tilmicosina fosfato	200.0	mg
Florfenicol	100.0	mg
Dipirona sódica	200.0	mg
Bromhexina clohidrato	3.0	mg

INDICACIONES:

Efectiva combinación de antibióticos de amplio espectro adicionada con un expectorante y antipirético. En los bovinos de carne, terneros y ganado lechero en periodo seco, está indicado en el tratamiento de enfermedades respiratorias, diarreas de terneros, pododermatitis, queratitis, infecciones del tracto genital e infecciones en general, causadas por: Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Klebsiella spp, Shigella spp, Histophilus somni, Corynebacterium pyogenes, E. coli, entre otras, así como las infecciones asociadas o complicadas por Mycoplasma spp. En porcinos es empleado en el tratamiento de enfermedades del tracto respiratorio como: pleuropneumonía, pasteurelosis, neumonía enzoótica, rinitis atrófica y en diarreas por E. coli e infecciones asociadas o complicadas con M. hyopneumoniae

DOSIS:

· **Bovinos:** 1 ml de TILMIFLOR EXPECTOPLUS por cada 15 kg de peso vivo, realizar una segunda aplicación del producto a las 48 horas.
· **Porcinos:** 1 ml de TILMIFLOR EXPECTOPLUS por cada 30 kg de peso vivo, realizar una segunda aplicación del producto a las 48 horas

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Intramuscular profunda.

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA DAVETSA

Oxitocin Iny 20

Solución Inyectable

Fórmula:
Cada 1 mL contiene:
Oxitocina sintética.....20.0 UI
Vehículo cbp.....1.0 mL

INDICACIONES:

Oxitocin Iny 20 está indicada para estimular la secreción de la leche, para tratar la agalactia, como tratamiento coadyuvante contra la mastitis y para provocar la contracción del útero en la inducción del parto. Además para potenciar las contracciones uterinas posparto y la expulsión de líquidos o membranas fetales.

DOSIS:

* **Bovinos productores de carne y leche:** 40 a 60 UI (2 a 3 mL) cada 2 horas.
* **Equinos:** 20 UI (1mL), 1 a 3 veces al día.
* **Porcinos:** 20 a 50 UI (1 a 2.5 mL).
* **Caninos**: 1 a 5 UI (0.05 a 0.25 mL) cada 30-60 minutos.
* **Felinos:** 5 UI (0.25 mL) una sola vez.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Intramuscular, intravenosa y subcutánea

Dipiron VS

Solución Inyectable

Fórmula:
Cada 1 mL contiene:
Dipirona sódica.....500.0 mg
Vehículo c.b.p.....1.0 mL

INDICACIONES:

Dipiron VS está indicada como coadyuvante en enfermedades donde hay inflamación, fiebre y dolor.

DOSIS:

* **Bovinos y equinos:** 8 mL por cada 100 kg de peso vivo del animal.
* **Porcinos, novillos y potros:** 5 a 15 mL ó 10 a 30 mL, según el peso del animal.
* **Ovinos y caprinos:** 3 a 8 mL
* **Caninos y felinos:** 2 a 5 mL

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Intramuscular profunda.
Subcutánea o intravenosa lenta.

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA DAVETSA

Magapor®

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA
DAVETSA

DURAGEN

Diluyente De Extra-larga Duración

Magapor®

INDICACIONES:

Solución biológica de alto rendimiento para la conservación de semen porcino, fabricado bajo
el control de calidad de diluyentes de alto rendimiento.

* Contiene precursores energéticos eficientes para ser utilizados por las mitocondrias, mejorando así la respiración y la motilidad de los espermatozoides.
* Su combinación de tampones biológicos específicos regula y amortigua los cambios de pH, manteniendo la funcionalidad de las células espermáticas.
* Incorpora protectores de membrana y tienen una alta capacidad antioxidante, protegiendo la membrana de los espermatozoides de la lipo-peroxidación.
* Contiene antibióticos según Directiva del Consejo Europeo 90/429/CEE.
* Posee efectivas combinaciones antibióticas de amplio espectro.
* No contiene proteínas de origen animal.
* Incluye estabilizadores de membrana y protege contra la capacitación temprana de los espermatozoides.

DURAGEN APORTA UN PLUS ADICIONAL:

* Protección adicional ante la lipo-peroxidación de las membranas debido a la combinación especifica de antioxidantes de última generación.
* Una acción antibacteriana de mayor espectro.
* Duragen está especialmente indicado para situaciones muy exigentes: CIAS con criterios de calidad internos rigurosos, transporte internacional, dosis de alto valor genético, necesidad de más tiempo de conservación, etc

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA
DAVETSA

VITASEM

Diluyente de larga Duración

INDICACIONES:

Solución biológica de alto rendimiento para la conservación de semen porcino, fabricado bajo el control de calidad de diluyentes de alto rendimiento

* Contiene precursores energéticos eficientes para ser utilizados por las mitocondrias, mejorando así la respiración y la motilidad de los espermatozoides.
* Su combinación de tampones biológicos específicos regula y amortigua los cambios de pH, manteniendo la funcionalidad de las células espermáticas.
* Incorpora protectores de membrana y tienen una alta capacidad antioxidante,
protegiendo la membrana de los espermatozoides de la lipo-peroxidación.
* Contiene antibióticos según Directiva del Consejo Europeo 90/429/ CEE.
* Posee efectivas combinaciones antibióticas de amplio espectro.
* No contiene proteínas de origen animal.
* Incluye estabilizadores de membrana y protege contra la capacitación temprana de los espermatozoides.

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA DAVETSA

HIGIPAL

Toallitas higiénicas

Magapor®

INDICACIONES:

Toallitas higiénicas para limpiar las zonas genitales antes de la inseminación.

* No incorpora productos espermicidas.
* No incorpora productos irritantes.
* Formuladas bajo control farmacéutico.

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA DAVETSA

MAGACELL

Colorímetro

CÁLCULO DEL NÚMERO DE DOSIS SEMINALES

- Permite lecturas instantáneas de absorbancia o dato directo de dosis.

- Lector digital de alto contraste en cristal líquido LCD.

- Rápidez y precisión en el cálculo del número de dosis.

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA DAVETSA

SIMPLYBAG

Envasado simple de dosis seminales

Magapor®

* Sellado mediante pinza manual
* Soporte para 6 blisters y rollo de blisters manual
* Estructura de aluminio

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA DAVETSA

HYGITUBE

Tubo desechable de llenado para Bagmatic y Simplybag

- Diseñado para asegurar el bombeo del semen diluído en condiciones óptimas de higiene y evitar problemas de contaminación.

- Elimina el riesgo de contaminaciones cruzadas.

- Uso máximo recomendado: 1.500 dosis

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA DAVETSA

SEMENBAG Y SMALLBAG

Bolsas para envasado de dosis seminales con ccontrol de reprotóxicos (RTC)

Magapor®

* Producida bajo los más estrictos controles de calidad, Semenbag y Smallbag, preservan cu contenido en las mejores condiciones.

* Packaging y formatos desarrollados para su comodidad en el Centro de Inseminación.

* La presentación de Semenbag y Smallbag automáticas es de 1250 unidades por rollo, ahorra tiempo en el cambio de rollos.

* Packaging exterior diseñado para ahorrar espacio y ser más práctico en la colocación del rollo.

SEMENBAG
(automática)z

SEMENBAG
(automática)
PRECORTADAS

SMALLBAG
(automática)

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA
DAVETSA

MAGASCAN

Ecógrafo wifi

- Profundidad: 100 - 180 mm ajustable.
- Transmisión a dispositivo móvil (tablet o smartphone).
- Mediciones de distancia, área y obstetricia.
- Sonda y tablet impermeables.
- Imagen de alta calidad.
- Incluye tablet de 8' y carcasa protectora.
- Con maletín de transporte.

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA DAVETSA

CÁMARAS DE CONSERVACIÓN

* Equipos para la conservación de dosis seminales, evitando el choque térmico y manteniendo las dosis en condiciones óptimas de conservación.

- Regulación de temperatura con zona neutra que reduce el consumo energético y alarga la vida del compresor.
- Recirculación de aire para una perfecta homogeneización de la temperatura.
- Termostato con alarma
- Resolución de temperatura 0.1ºC, rango de temperatura a interior 15-40ºC.

Z-100

* Volúmen nominal: 130 lts.
* Dosis óptimas Semenbag: 280.
* Potencia nominal: 65 W.

Z-300

* Volúmen nominal: 256 lts.
* Dosis óptimas Semenbag: 520.
* Potencia nominal: 225 W.

Z-450

* Volúmen nominal: 344 lts.
* Dosis óptimas Semenbag: 680.
* Potencia nominal: 270 W.

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA
DAVETSA

MICROSCOPIOS

Magapor®

- Ergonómicos, de gran robustez y estabilidad, con mandos coaxiales a ambos lados para el enfoque macro y micrométrico.

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA DAVETSA

KUBUS

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA
DAVETSA

CANULA ESPIRAL CON TRASERA

KUBUS

DESCRIPCIÓN:

- Catéter espiral antirreflujo naranja.
- Cánula Bell (salidas laterales).
- Con trasera.
- Empaquetado individualmente (1 xl)

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA DAVETSA

CONJUNTO POST-CERVICAL (CANULA+SONDA)

KUBUS

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA DAVETSA

TOALLITAS DESINFECTANTES KUBUS

PRESENTACIÓN:

- 125 UNIDADES
- 800 UNIDADES

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA
DAVETSA

BOTELLITA DESCARTABLE

KUBUS

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA
DAVETSA

GEL LUBRICANTE

KUBUS

INDICACIONES:

* Lubricante eficaz para la introducción vaginal suave del catéter.
* Elimina riesgo de erosión por sequedad.
* No espermicida.

MODO DE EMPLEO:

Se trata de un lubricante para uso durante inseminación artificial en Bovino, Equino, Porcino y Ovino. Puede ser utilizado en manos y brazos en examinaciones rectales y vaginales o en tratamientos obstétricos así como en inseminaciones artificiales.

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA
DAVETSA

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA
DAVETSA

BEBEDERO BASCULANTE MAXI

ROTECNA
Nº1 EN INNOVACIÓN PORCINA

INDICACIONES:

Para un buen consumo de agua el bebedero reúne las dos características más importantes: Un caudal constante y un fácil acceso incluso para los lechones más pequeños. El bebedero basculante para engordes.

- Reducción hasta un 50% de desperdicio de agua.
- Hasta un 50% menos purines.
- Ahorro de medicamento.
- Su acción basculante ayuda a mantener la calidad higiénica del agua.

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA
DAVETSA

EASY PAN

Easy Pan es un plato Ideal para allmentar lechones en parideras.

- Su amplio plato facilita el acceso al pienso. pudiendo comer varios a la vez.
- Acabado especial del plato para evitar esquinas, facilitando la llmpleza y maximizando la higiene.
- Empuñadura con flecha para facilitar el anclaje.
- Enganche apto para cualquier tipo de suelo (metéllco, plástico. etc.).
- Su exclusivo diseño y sus aletas evitan el desperdicio del pienso.

Nº Bocas	5
Capacidad Plato	2,6
Altura, cm	32
Diámetro, cm	27

MAXI HOOPER PAN

ROTECNA
Nº1 EN INNOVACIÓN PORCINA

INDICACIONES:

Plato de soporte Ideal para el sistema Wean to Flnlsh. Su acertado diseño y los buenos resultados productivos la han convertido en uno de los productos lideres de ROTECNA Y ahora. mejorado.

- Un ajuste más preciso gracias a la regulación progresiva.
- La tolva translúcida permite ver la cantidad de pienso dentro.
- Rejilla de plato sin remaches ni rincones. muy higiénica y fácil de limpiar.
- Menor volumen de transporte gracias al fácil montaje “in situ.

Nº Bocas	10
Nº de animales / tolva	20 - 30
Peso animales, kg	6- 15
Capacidad plato l	9
Capacidad tolva, l	21
Capacidad suplemento, l	30
Altura plato, cm	8
Diamétro plato, cm	42.5

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA
DAVETSA

GROW FEEDER COMEDERO TUBULAR DE ENGORDE

Sólo la evoluclón de la genuina tolva de engorde podra ser mejor que su antecesora.

- Gran capacidad. Incrementa en un 30% su capacidad.
- Mayor precisión con más posiciones de regulación: 13 puntos.
- Posibilidad de agua a derecha o izquierda.
- Tolva inyectada en una sola pieza. Acabado robusto. sin juntas. ni aristas. que facllita su limpieza.
- Fácil accionamiento del gatillo de apertura del mecanismo.
- El tubo para el agua está integrado.
- Apllable.

Para la mejor adaptación de los lechones más pequeños mejorando el ya excelente Indice de conversión:

- Mecanismo de caída más largo.
- Chupete inclinado.

Nº Animales / tolva	10- 15
Peso animales, kg	15 - 120
Capacidad tolva, l	60
Uso apto para	engorde (cebo)
Alimentación	secohúmedo
Posiciones	13
Nº Bocas	1
Altura, cm	108
Ancho, cm	37
Fondo, cm	34
Acceso a plato, cm	14
Peso, kg	8.6

ROTECNA
Nº1 EN INNOVACIÓN PORCINA

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA
DAVETSA

WING R3 COMEDERO DE ENGORDE

ROTECNA
Nº1 EN INNOVACIÓN PORCINA

• Plato en 2 niveles que separa alimento y agua.
• Mecanismo unidireccional que permite un fácil aprendizaje de los lechones pequeños sin riesgo de dañarse la cabeza.

	1	2	3
Nº animales / tolva	30 - 50	30 - 50	30 - 50
Peso animales, kg	6 - 120	6- 30	20 - 120
Capacidad tolva, 1	95	95	95
Altura de boca	125	125	125
Diámetro máx tolva	57	57	57
Diámetro mín tolva	14	14	14
Ancho plato	55	70	70
Largo plato	45	35	50
Altura plato	10 + 3	8	12

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA
DAVETSA

TR-4 COMEDERO DE DESTETE

La nueva generación de tolvas TR en seco para destete: TR-4 crecen y mejoran sus prestaciones para continuar siendo la mejor opción para el ganadero más exigente.

NUEVAS VENTAJA:

- Mayor altura, más capacidad. Con ello se evita que los lechones puedan acceder a su Interior.
- Pies elevados. mayor higiene.
- Además. la ausencia de rincones en su interior por estar construída en una pieza. facllta la llmpleza y el mantenimiento de las óptimas condiciones higiénicas.
- Mayor Robustez.

ADEMÁS. LAS VENTAJAS DE SIEMPRE:

- Su fácil regulación. El sistema exclusivo de rasera (sistema sandwich permite la regulación con la tolva llena de alimento.
- La mayor durabilidad por estar construida íntegramente en plástico
- La tolva TR4 tiene 4 bocas

	TR4
Nº Bocas	4
Nº animales / tolva	25
Peso animales, kg	6 - 40
Capacidad tolva, l	120
Altura, cm	70
Con suplemento, cm	80
Ancho, cm	30
Largo, cm	80
Largo boca, cm	18.7

MINITAINER BEBEDERO

ROTECNA
Nº1 EN INNOVACIÓN PORCINA

LECHONA EN PARIDERAS

- Los animales disponen siempre de agua limpia y en perfecto estado sanitario.
- La cazoleta evita que se desperdicie el agua y en consecuencia que aumente la producción de purines.
- Especialmente diseñado para que los lechones tengan un buen acceso al agua.
- Distancia del suelo 5-8 cm.
- Caudal regulable.

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA
DAVETSA

Nl-2 MÓVIL

El Nl-2 móvll és una cubierta transportable para lechones en parideras. Se puede cambiar de una plaza a otra fácilmente.

VENTAJAS :

- •Móvil y fácilmente intercambiable.
- Puede reducir entre un 20-40% el coste energético.
- Puede Incrementar entre un 0,2 y 0,5 de lechones destetados por cerda y año.
- Aumento del peso de los lechones al destete.
- Protege de corrientes de aire.

CARACTERÍSTICAS

- Fácil de limpiar por su posibilidad de levantar y acceder a la parte inferior.
- Opción de apertura superior para la colocación de lámpara Infrarroja y LEO
- Regulable en altura.
- Fácil de acoplar.
- No necesita Instalación.
- Adaptable a cualquier maternidad.
- Diseño especialmente ideado para facilitar las labores de limpieza.

PISOS DE DESTETE

Los slats de destete tienen el diseño ideal para la confortabilidad de los lechones y obtener un crecimiento más rápido. sin agresiones a las extremidades.

- Gran durabilidad.
- Fabricado en polipropileno que le da una gran flexibilidad y gran resistencia al impacto.
- Comblnables con el resto de slats Rotecna.
- La gama de medidas más extensa del mercado.
- Fácil de limpiar y desinfectar.
- Confortables poco agresivas y cálidas.
- Fácil y rápido montaje.

Piso de destete 40 x 60

	Peso animal máx, kg	Relieve anti-dezlizante	Costillas convexas
10 x 50	120	sí	-
10 x 40	120	sí	-
20 x 40	110	sí	-
60 x 50	110	sí	-
60 x40	110	sí	-
60 x 60	60	sí	sí
60 x 60 10%	60	sí	-
60 x 60 C	60	sí	-

PISOS DE DESTETE

Los slats de destete tienen el diseño ideal para la confortabilidad de los lechones y obtener un crecimiento más rápido. sin agresiones a las extremidades.

- Gran durabilidad.
- Fabricado en polipropileno que le da una gran flexibilidad y gran resistencia al impacto.
- Combinables con el resto de slats Rotecna.
- La gama de medidas más extensa del mercado.
- Fácil de limpiar y desinfectar.
- Confortables poco agresivas y cálidas.
- Fácil y rápido montaje.

Piso de destete 60 x 50

	Peso animal máx, kg	Relieve anti-dezlizante	Costillas convexas
10 x 50	120	sí	-
10 x 40	120	sí	-
20 x 40	110	sí	-
60 x 50	110	sí	-
60 x40	110	sí	-
60 x 60	60	sí	sí
60 x 60 10%	60	sí	-
60 x 60 C	60	sí	-

PISO DESTETE 60 x 80

El slat de 600 x 800 mm está destinado a cubrir los suelos en salas de destetes.

- Más ancho: 80 cm.
- Menos juntas entre slats.
- Menos uso de viguetas de soporte.
- Gran resistencia y durabilidad.

El diseño de sus costillas convexas facilita la evacuación de purines y limpieza.
El DOBLE PUENTE central además de dar mayor resistencia al slat. permite cortarlo (30 x 80 + 30 X 80 cm).

	Peso animal máx, kg	Relieve anti-dezlizante	Costillas convexas
10 x 50	120	sí	-
10 x 40	120	sí	-
20 x 40	110	sí	-
60 x 50	110	sí	-
60 x40	110	sí	-
60 x 60	60	sí	sí
60 x 60 10%	60	sí	-
60 x 60 C	60	sí	-

PISOS DESTETE 120 x 50 cm

ROTECNA
Nº1 EN INNOVACIÓN PORCINA

- Permite equipar salas con mayor rapidez y ahorro en costes de instalación y soportes.
- Confort calidez y gran resistencia.
- Fácil limpieza y desinfección. esencial para evitar la transmisión horizontal de enfermedades.

	Peso animal máx, kg	Relieve anti-dezlizante
120 x 50	50	sí
120 x 50 10%	50	-



DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA
DAVETSA

PISOS MADRE

ROTECNA
Nº1 EN INNOVACIÓN PORCINA

SLATS MADRES

* Fabricadas con polipropileno de gran resistencia, durabilidad y flexibilidad.
* Por su gama de medidas. posibilitan multiples combinaciones.
* Confortables y poco agresivas.
* Muy higiénicas

	Peso animal	Relieve anti-dezlizante
60 x 80	250	sí
60 x 40	250	sí
60 x 30	120	sí
60 x 20	120	sí
20 x 60	-	sí

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA
DAVETSA

PISO MADRE 40 x 60

ROTECNA
Nº1 EN INNOVACIÓN PORCINA

* Los slats de madres 600x400 están diseñados para soportar agresiones extremas por parte de la cerda y a la vez que sean confortables tanto para la madre como para los lechones.

* Apto para colocar debajo de la madre.

	Peso animal máx, kg	Relieve anti-dezlizante
60 x 80	250	sí
60 x 40	50	sí
60 x 30	120	sí
60 x 20	120	sí
20 x 60	-	sí

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA
DAVETSA

PISO MADRE 60 x 80

ROTECNA
Nº1 EN INNOVACIÓN PORCINA

SLATS MADRES

* Fabricadas con polipropileno de gran resistencia. durabilidad y flexibilidad.
* Por su gama de medidas, posibilitan multiples combinaciones.
* Confortables y poco agresivas.
* Muy higiénicas

	Peso animal	Relieve anti-dezlizante
60 x 80	250	sí
60 x 40	250	sí
60 x 30	120	sí
60 x 20	120	sí
20 x 60	-	sí

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA
DAVETSA

SOW BOWL COMEDERO DE GESTACION

- Mantiene la máxima higiene al no existir rincones de pienso.
- Protección de acero inoxidable 10096.
- Polietileno de alta densidad.
- Totalmente Inalterable.
- Perfectamente combinable con la válvula VR-H.

Nº animales / comedero	1
Capacidad, l	-
Altura máxima, cm	39
Altura mínima, cm	16
Ancho, cm	46
Largo, cm	33

TR-2 COMEDORES DE ENGORDE

ROTECNA
Nº1 EN INNOVACIÓN PORCINA

La nueva tolva de 2 bocas TR-2. responde a un nuevo concepto de tolva en seco ideal para engordes. Con la TR-2, pretendemos ofrecer al ganadero la mejor opción en esta fase productiva.

- El diseño de sus bocas en v. facilita el acceso a 2 animales grandes a la vez.
- Manipular la regulación con la tolva llena de allmento(rasera sistema SANDWICH).
- Mayor durabilidad en optimas condiciones. construcción íntegra en plástico (polipropllieno de alta densidad) y acero lnoxidable.
- Mejor caída y deslizamiento interior del alimento.
- Optimiza el transporte y su montaje al presentarse apilada y paletizada.
- La ausencia de porosidad de rincones y la presencia de pies en la base de la tolva, facilitan la limpieza, garantizando una mejor desinfección y manteniendo de un alto nivel higiénico.

Nº animales / tolva	20 -22
Peso animales, kg	18 - 120
Capacidad tolva l	130
Altura, cm	110
Ancho, cm	60
Fondo, cm	40
Acceso a plato, cm	16
Bocas	2
Ancho bocas, cm	55
Peso, kg	12.5

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA
DAVETSA

VALLAS PVC A MEDIDA

ROTECNA
Nº1 EN INNOVACIÓN PORCINA

* Las vallas PVC, en sus versiones ciega y ventilada, permiten la construcción de corrales para lechones en maternidad y transición.

* Los extremos de los perfiles están terminados en U de PVC soldada con ultrasonido para mejorar la higiene, gracias a su acabado carente de espacio donde se puede acumular la suciedad.

- Sistema modular a medida
- Fácil instalacion y manejo
- Mayor durabilidad

500 | 700 | 700 (500+100)

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA
DAVETSA

PERFIL T

Las viguetas Perfil T tienen una gran resistencia.

* Fabricadas con resina sintética y fibra de vidrio

* No se ven afectadas por el amoniaco del purín ni por los aminoácidos del pienso.

* Su diseño en T les confiere una gran resistencia.

* Con el Silent Block T, el perfil mejora la estabilidad

* Fácil limpieza

DEL0G40	Perfil T-90mm
DEL0G41	Perfil T-120 mm
02803001	Silent Block T

Silent Block T.

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA
DAVETSA

CIRCOVAC

Vacuna inactivada / Para la inmunización contra Circovirus Porcino tipo 2 con adyuvante oleoso

Fórmula:
Cada mililitro (ml.) del producto reconstituido contiene: Principio activo: Circovirus Porcino Tipo 2 Inactivado a una concentración mayor ó igual a 1.8 log10 Unidades ELISA. Excipiente Thimerosal. Adyuvante: Aceite ligero de parafina.

INDICACIONES:

CIRCOVAC® es una vacuna liquida inactivada en adyuvante oleoso, indicada para la inmunización activa o pasiva de lechones con el objetivo de reducir en estos la infección, excreción viral, lesiones y síntomas clínicos causados por el Circovirus porcino tipo 2 (PCV-2), agente del SDML (Síndrome del Desgaste Multisistémico Porcino).

DOSIS YCVIA DE ADMINISTRACION:

Mezclar el contenido del frasco de CIRCOVAC® Suspensión con el contenido del frasco de CIRCOVAC® Emulsión. Aplicar por vía intramuscular profunda, de acuerdo con el siguiente esquema de vacunación:

* **Lechones:** Administrar una dosis única de 0.5 ml. a partir de la 3a ó 4a semana de edad. La revacunación no es requerida. Vacune solo lechones de madres no vacunadas.
* **Cerdas:** Primovacunación - Dos dosis de 2.0 ml. c/u con 3-4 semanas de intervalo, por lo menos, 2 semanas antes del apareamiento. Revacunación -Una dosis de 2.0 ml en cada gestación en 3 esquemas; antes de la IA al destetar a la hembra, vacunación general a todo el hato excepto cerdas que se acaban de inseminar o una dosis 2-4 semanas antes del parto.

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA
DAVETSA

HYOGEN

Bacterina inactivada para la inmunización de cerdos contra infecciones ocasionadas por Mycoplasma hyopneumoniae

Fórmula:
HYOGEN® es una bacterina preparada a partir de cultivo inactivado de Mycoplasma hyopneumoniae cepa 2940 combinado con Imuvant™ (adyuvante oleoso J5 propiedad de Ceva) y timerosal como conservador.

INDICACIONES:

HYOGEN® está indicado para la inmunización activa de cerdos contra la neumonía enzoótica porcina, causada por *Mycoplasma hyopneumoniae.*

DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACION:

La vacuna se debe administrar por vía intramuscular, en la tabla del cuello.

* Administrar una dosis única de 2 ml a partir de los 21 días de edad.
* En caso de infección temprana, es opcional administrar dos veces, una dosis de 1 ml a partir de la primera semana de edad. La segunda dosis se administra con un intervalo de 2 a 3 semanas.

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA DAVETSA

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA
DAVETSA

SUISENG

Suspensión inyectable para porcino

INDICACIONES:

Lechones: Para la protección pasiva de lechones recién nacidos mediante la inmunización activa de cerdas reproductoras adultas y nulíparas para reducir la mortalidad y los signos clínicos de enterotoxicosis como la diarrea, causados por Escherichia coli enterotoxigénicas, que expresan los factores de adhesión F4ab (K88ab), F4ac (K88ac), F5 (K99) o F6 (987P). Para la inmunización pasiva de lechones recién nacidos frente a la Enteritis Necrótica mediante la inmunización activa de cerdas reproductoras adultas y nulíparas para inducir anticuerpos seroneutralizantes frente a la toxina β de Clostridium perfringens tipo C.

Cerdas adultas y nulíparas: Para la inmunización activa de cerdas adultas y nulíparas para inducir anticuerpos seroneutralizantes frente a la toxina α de Clostridium novyi tipo B. La relevancia de los anticuerpos seroneutralizantes no se ha determinado experimentalmente. Los anticuerpos se detectan a partir de las 3 semanas tras la vacunación.

POSOLOGÍA PARA CADA ESPECIE, MODO Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

* Intramuscular, en los músculos del cuello.

Porcino: 2 ml/animal.

El programa de vacunación básico consiste en dos dosis: la primera dosis a las 6 semanas aproximadamente antes del parto y la segunda dosis a las 3 semanas aproximadamente antes del parto. Es recomendable administrar la segunda dosis preferiblemente en lados alternos.

Revacunación: en cada gestación subsecuente, administrar una dosis 3 semanas antes de la fecha esperada del parto.

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA
DAVETSA

ERYSENG PARVO LEPTO

Suspensión inyectable para cerdos

INDICACIONES:
Para la inmunización activa de las cerdas para la protección de la progenie frente a la infección transplacentaria causada por parvovirus porcino. Para la inmunización activa de los cerdos para prevenir los signos clínicos y lesiones causadas por la Erisipela, serotipo 1 y serotipo 2.
Para la inmunización activa de los cerdos para prevenir la leptospirosis.

POSOLOGÍA PARA CADA ESPECIE, MODO Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
* Vía Intramuscular.
* Administrar una dosis de 2 ml por inyección intramuscular en los músculos del cuello de acuerdo con el siguiente programa:

Vacunación básica:
Los cerdos de 6 meses de edad que no hayan sido vacunados previamente con el producto deben recibir dos inyecciones con un intervalo de 3-4 semanas. La segunda inyección se debe administrar 3-4 semanas antes de la cubrición.

Revacunación:
Debe administrarse una sola inyección 2-3 semanas antes de cada cubrición posterior.

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA
DAVETSA

sanfer®

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA
DAVETSA

AMOXIDEX 100ML S/M

sanfer®

Antimicrobiano para el tratamiento y control de infecciones.

Fórmula:
Cada ml contiene:
Amoxicilina estéril en forma de trihidrato.....150mg
Acetato de dexametasona.....0.51 mg
Vehículo c.b.p.....1 ml

INDICACIONES:

Bovinos: Neumonías diarreas en becerros, enteritis, septicemias, mastitis, metritis, pododermatitis, retención placentaria, pielonefritis y en la prevención de infecciones post-quirúrgicas.
Ovinos y caprinos: Neumonías, mastitis, metritis y pododermatitis.
Porcinos: Neumonías, metritis, síndrome MMA y enteritis.
Caninos: Infecciones secundarlas asociadas con dermatitis, enteritis, otitis, leptospirosis, faringitis y tonsilitis. Heridas post-quirúrgicas, infecciones respiratorias y urogenitales.
Felinos: Infecciones secundarias asociadas con virus respiratorios, enteritis, otitis e infecciones post-quirúrgicas.

VIA DE ADMINISTRACION:

Intramuscular o subcutánea

DOSIS:

15 mg/kg de peso vivo con base en la amoxlcllna. equivalente a 1 ml/10 kg de peso vivo.

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA
DAVETSA

Lapisa®

ANIMALES DE COMPAÑÍA

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA

DAVETSA

LAPI-RACTO

Lapisa®
ANIMALES DE COMPAÑÍA

Fórmula:
Cada kg contiene:
Clorhidrato de Ractopamina .....24 g
Excipiente c.b.p.....1 kg

Ingredientes:
Proteína cruda.....11.74%
Grasa cruda.....1.30%
ELN 62.23%
Cenizas 19.82%
Humedad..... 4.86%
Calcio.....0.14%
Fósforo..... 0.07%

INDICACIONES:

LAPI-RACTO® es efectivo para aumentar la tasa de ganancia de peso. Mejorar la eficiencia alimenticia, incrementar el porcentaje de rendimiento de la canal y de cortes magros en cerdos en finalización que reciben una dieta nutricionalmente balanceada.

DOSIS

Adminístrese por vía oral a través del alimento balanceado. Las dosis recomendadas. de **LAPI-RACTO®** en el alimento final son: 5 a 10 ppm para aumentar la tasa de ganancia de peso y mejorar la eficiencia alimenticia, aumentar el porcentaje de rendimiento de canal e incrementar la carne magra.

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA
DAVETSA

MONTANA

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA
DAVETSA

CHUSPISOL

MONTANA

INDICACIONES:

Es un efectivo insecticida para el control de moscas elaborado en base a thiametoxam. grupo químico neonicotinoide. nene un rápido efecto de derribo. lo que nos permite dirigir la caída a lugares seguros permitiendo la evaluación del tratamiento. Las vías de ingreso son por contacto e ingestión.

El Z-9 Tricosene o muscalure, es una potente feromona especifica para la mosca doméstica y que en la naturaleza es producida por la hembra para atraer al macho.

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA
DAVETSA

Veesure

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA
DAVETSA

Lecisure

Emulsionante Natural

Fórmula:
Cada 1000 g contiene:
Lecitina.....E322
Extracto de soya.....500 kg
Excipientes….q.s.....hasta 1 kg

INDICACIONES:
Mejora la biodisponibilidad de nutrientes solubles en agua y solubles en grasa. Evita el desperdicio de grasa / aceite por indigestión. Evita la acumulación de grasa y miniza la grasa abdominal. Mejora la ración de conversión alimenticia y el rendimiento general. Mejora la absorción de nutrientes del intestino. Ayuda a extraer el máximo valor nutricional de las raciones de alta densidad. Excelente digestibilidad de una grasa, lo que ayuda a la utilización óptima de la energia de la grasa / aceite. Maximiza la digestión enzimática del alimento manteniendo y estimulando la capacidad funcional del hígado, páncreas, conductos biliares e intestino delgado.

DOSIS:
Aves de corral: 200 a 300 g / ton de alimento
Porcinos: 500 g/ ton de alimento o lo recomendado por el nutricionista Veterinario

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA DAVETSA

Herbosure-C

Suplemento herbolario para reemplazar la Vitamina C Sintetica

Fórmula:
Cada 1000 g contiene:

Limón cítrico	200 g
Psidium guajava	100 g
Emblica officinalis	400 g
Citrus sinensis	200 g
Carica papaya	100 g

INDICACIONES:

Para optimizar la resistencia del cuerpo por medio de la viabilidad. Para optimizar la producción de huevos y la calidad de la cáscara en aves ponedoras. Para optimizar la fertilidad y la incubabilidad en reproductoras. Para optimizar el rendimiento general de las aves. Mejora la inmunidad humoral y mediada por células dañada por el estrés (reduce la ración de heterocitos: linfocitos en condiciones de estrés por calor) Como antioxidante controla el daño tisular causado por radicales libres y otras toxinas. Ayuda a mantener la homeostatis: secreción de conticosteroides y regulación de la temperatura corporal.

DOSIS:

Aves y cerdos: 100 g por tonelada de alimento o según las indicaciones de un nutricionistas / consultor.

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA DAVETSA

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA
DAVETSA

BENACID 350 ESSENTIAL

Ácidos Orgánicos y Aceites Esenciales Microencapsulados

SILA ADVANCED NUTRITION

Fórmula:

1a297- Ácido Fumárico....................................200.000 mg
E296 – D,L – Acido Málico..................................80.000 mg
E 330 – Ácido Citrico.......................................40.000 mg
1a338 – Ácido Ortofosfórico..............................30.000 mg
Vehículo...1.000 g

Es producto debe ser mezclado con el alimento animal en las siguientes concentraciones:

- Aves 200 – 400 g/Ton de Alimento completo
- Pavos 0.5 -1kg / Ton de Alimento completo
- Cerdos 0.5 – 1 kg/ Ton de Alimento completo



Ficha Técnica
SILA CODE: SILA 04

SILA ADVANCED NUTRITION

BENACID 350 Essential

ÁCIDOS ORGÁNICOS Y ACEITES ESENCIALES MICROENCAPSULADOS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	**PREMEZCLA para uso exclusivo en Alimento Animal**
COMPOSICIÓN	**Aditivos:** *Conservantes* 1a297 - Ácido Fumárico 200.000 mg E 296 - D,L-Ácido Málico 80.000 mg E 330 - Ácido Cítrico 40.000 mg 1a338 - Ácido Ortofosfórico 30.000 mg *Aromatizantes naturales, o los correspondientes aromatizantes sintéticos, químicamente definidos* Mezcla de Compuestos Saborizantes 18.000 mg Vehículo a 1.000 g - hecho de: Ácidos Grasos Vegetales Hidrogenados (de palma), almidón de maíz, sulfato cálcico dihidrato, lignocelulosa.
PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS	**Descripción:** microcápsulas **Densidad:** 0,6-0,9 g/ml **pH (sol. 10%):** 1,0-4,0 **Perdida en el secado:** 5% max **Color:** beige **Tamaño de partícula:** <500 μm, 15% max; >2 mm, 0,5% max
CUMPLIMIENTO DE OTRAS REGULACIONES	Este producto no contiene subproductos de origen animal (Reg. CE 1069/2009). Este producto no contiene OMG, y no se produce a partir de OMG, no contiene ingredientes derivados de OMG (Reg. CE 1829/2003). Este producto es apto para uso en Alimento Animal y cumple con la legislación vigente de ingredientes en Alimento Animal (Reg. CE 1831/2003, Reg. CE 183/2005, Reg. CE 767/2009). Este producto cumple con la Directiva 2002/32/CE y las enmiendas subsecuentes sobre sustancias indeseables en la Alimentación Animal.
CATEGORÍAS ANIMALES Y ESPECIES	Este producto es para uso en la formulación de Alimento Animal y productos relacionados para aves y cerdos.
INSTRUCCIONES PARA SU USO	Este producto debe ser mezclado con el Alimento Animal en las siguientes concentraciones: *Aves:* 200-400 g/Ton de Alimento completo *Pavos:* 0,5-1 kg/Ton de Alimento completo *Cerdos:* 0,5-1 kg/Ton de Alimento completo
RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y PARA EL MANEJO	Información adicional sobre el manejo de este producto se encuentra en la Hoja de Seguridad.
ALMACENAJE Y VIDA ÚTIL	Este producto se debe almacenar en el embalaje original, en lugar Seco, Fresco y oscuro. Bajo estas condiciones, la vida útil es de 24 meses.
EMPAQUE	Bolsas de Papel de 25 kg con forro de aluminio en paletas de 1.000 kg.

MONOGASTRICS LINE

SILA

GMP+ FAMI-QS

La información en esta Ficha Técnica es, bajo nuestro mejor juicio, atinada y verdadera. Todas las instrucciones, recomendaciones y sugerencias se deben tomar con reserve. Siendo que existen condiciones y factores mas allá de nuestro control, el fabricante se deslinda de cualquier responsabilidad por perdidas o daños ocasionados por el uso de esta información, sugerencias y recomendaciones.

Rev. 2 del 03.03.2020

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA DAVETSA

BENBUTYR 330

Butirato de sodio microencapsulado

Fórmula:
Ácidos Grasos Vegetales Hidrogenados (de palma), sales de ácidos grasos (butirato de sodio 330.000 mg), sulfato cálcico dihidrato. Valores Analíticos: Proteína Bruta 0,1%; Fibra Bruta 0,1%; Aceites y Grasas Brutos 52%; Ceniza Bruta 29%; Lisina 0%; Metionina 0%; Sodio 6,9%.



PATENTE

Ficha Técnica
SILA CODE: SILA 58

BENBUTYR 330
BUTIRATO DE SODIO MICROENCAPSULADO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	**ALIMENTO COMPLEMENTARIO para uso exclusivo en Dieta Animal**
COMPOSICIÓN	Ácidos Grasos Vegetales Hidrogenados (de palma), sales de ácidos grasos (butirato de sodio 330 000 mg), sulfato cálcico dihidrato. **Valores Analíticos:** Proteína Bruta 0,1%; Fibra Bruta 0,1%; Aceites y Grasas Brutos 52%; Ceniza Bruta 29%; Lisina 0%; Metionina 0%; Sodio 6,9%
PROPIEDADES FISICO-QUÍMICAS	**Descripción:** microcápsulas **Densidad:** 0,6-0,9 g/ml **pH** (sol. 10%): 7,0-9,0 **Tamaño de partículas:** < 500 µm, 15% max > 2 mm, 0,5% max **Pérdida en el secado:** 5% max **Color:** beige **kcal/100 g:** 642 **kJ/100 g:** 2237
CUMPLIMIENTO DE OTRAS REGULACIONES	Este producto no contiene subproductos de origen animal (Reg. CE 1069/2009). Este producto no contiene OMG, y no se produce a partir de OMG, no contiene ingredientes derivados de OMG (Reg. CE 1829/2003). Este producto es apto para uso en Alimento Animal y cumple con la legislación vigente de ingredientes en Alimento Animal (Reg. CE 1831/2003, Reg. CE 183/2005, Reg. CE 767/2009). Este producto cumple con la Directiva 2002/32/CE y las enmiendas subsecuentes sobre sustancias indeseables en la Alimentación Animal.
CATEGORÍAS ANIMALES Y ESPECIES	Este producto es para uso en la formulación de Alimento Animal y productos relacionados para aves y cerdos.
INSTRUCCIONES PARA SU USO	Este producto debe ser mezclado con el Alimento Animal en las siguientes concentraciones: *Pollos de engorde y ponedoras:* 450-900 g/Ton de Alimento completo *Pavos:* 900 g/Ton de Alimento completo *Lechones – fase 1:* 900 g/Ton de Alimento completo *Lechones – fase 2:* 900 g/Ton de Alimento completo *Cerdos (más de 35 kg):* 0,70-1,10 kg/Ton de Alimento completo
RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y PARA EL MANEJO	Información adicional sobre el manejo de este producto se encuentra en la Hoja de Seguridad.
ALMACENAJE Y VIDA ÚTIL	Este producto se debe almacenar en el embalaje original, en un lugar Seco, Fresco y oscuro. Bajo estas condiciones, la vida útil es de 48 meses. Las variaciones de color no afectan el rendimiento.
EMPAQUE	Bolsas de Papel de 25 kg con forro de PE en paletas de 1.000 kg.

SILA
GMP+

La información en esta Ficha Técnica es, bajo nuestro mejor juicio, alirada y verdadera. Todas las instrucciones, recomendaciones y sugerencias se deben tomar con reserve. Siendo que existen condiciones y factores mas allá de nuestro control, el fabricante no diestinda de cualquier responsabilidad por perdidas o daños ocasionados por el uso de esta información, sugerencias y recomendaciones.

Rev. 2 del 06.03.2020

Distribuidora Agroveterinaria DAVETSA



DAPASA

BUENOS RESULTADOS SON NUESTRO OBJETIVO

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA
DAVETSA

NÚCLEOS PARA CERDOS

Premezcla

DAPASA

Los núcleos nutricionales para cerdos de "PRODUCTOS DAVETSA", son combinaciones balanceadas de maíz, soya, afrecho, sal, aceite de palma, fosfato, carbonato de calcio, metionina, lisina, treonina, antibióticos, promotores, enzimas, acidificantes, vitaminas, minerales etc., mezcladas en equipos de alta precisión.

Su fórmula creada para las distintas etapas de desarrollo porcino desde sus primeras semanas de vida, hasta el cumplimiento de su propósito. Elaborado con vitaminas y minerales para un mejor aprovechamiento en su nutrición y desarrollo.

FASE DE NÚCLEO PARA CERDOS:

- Crecimiento
- Desarrollo
- Engorde Ractopamina
- Gestación
- Gestación preparto
- Lactancia
- Reemplazó

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA DAVETSA

Sephnos

invents to grow

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA
DAVETSA

WATER SAVER PLUS®

Sephnos
inventar para crecer

Bebedero plástico para cerdos con nipple pendulante con guardas ergonómicas tipo chupón que permite un máximo consumo de agua con un mínimo desperdicio.

CARACTERÍSTICAS:

• Fabricado con plástico 100% virgen y aditivos que le otorgan una alta resistencia y durabilidad.
• Se ensambla a un tubo metálico enroscado de 1/2 pulgada en la parte superior. Cada guarda porta un nipple metálico.
• Debe estar ubicado siempre entre 10 y 15 cm del lomo del animal, ajustando la altura conforme el animal crece.

BENEFICIOS:

• Sustituye al tradicional sistema de nipple colocados en las paredes que desperdician hasta un 30% de agua.
• El diseño ergonómico permite que el cerdo beba de frente, evitando el desperdicio de agua.
• Favorece al suministro vía agua de cualquier tipo de fármaco y/o medicamento reduciendo el desperdicio.
• Incrementa el consumo de alimento.
• Fácil limpieza y desinfección.

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA
DAVETSA

TURBO PIG®

Sephnos
inventar para crecer

Comedero plástico redondo ergonómico con 4 espacios individuales para lechones durante el periodo de lactancia.

CARACTERÍSTICAS:

• Fabricado con plástico 100% virgen y aditivos que le otorgan una alta resistencia y durabilidad.
• Se fija en cualquier tipo de piso de rejilla: plástico, metal o liso de concreto.
• Complementa la alimentación durante la etapa de la lactancia y favorece a que el lechón inicie su etapa de alimentación sólida, probando en cualquiera de sus espacios diferentes tipos de alimentos y aditivos.
• Consta de comedero redondo, manija triangular con flecha de dirección, varilla de acero inoxidable, tubo de plástico, resorte y tornillería.

BENEFICIOS:

• Mayor peso de la camada.
• Mejor uniformidad de la camada.
• Disminución en la conversión alimenticia.
• Ayuda en la disminución de la mortalidad.
• Superficies lisas y redondeadas para fácil lavado y desinfección.

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA DAVETSA

DOSIFICADOR SEMIAUTOMÁTICO

Sephnos
inventar para crecer

Dosificador de uso semiautomático que permite alimentar de manera simultánea grupos de cerdas en jaulas de gestación de manera rápida y fácil.

CARACTERÍSTICAS:

• Fabricada en polietileno virgen de alta densidad; calidad óptima y de fácil limpieza.
• Compuerta esférica con lastre para garantizar el cierre hermático.
• Capacidad para 3 kg. de alimento en harina.
• El llenado se realiza en forma manual; la dosificación la establece el operario.

BENEFICIOS:

• Versatilidad en cuanto a futuras expansiones para la automatización.
• Reducción del estrés al alimentar en forma simultánea el total de las cerdas en gestación.
• Adaptable a cualquier tipo de jaulas existentes.
• Reducción en el costo de mano de obra por alimentación.
• Fácil instalación.

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA
DAVETSA

OTROS

EQUIPOS

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA
DAVETSA

PELETIZADORA DE ALIMENTOS

También conocida como máquina granuladora, es un aparato que sirve para convertir un material en pequeñas piezas redondas llamadas gránulos o pellets. En otras palabras, se trata de un instrumento que se utiliza para crear trozos pequeños de diferentes materias primas para elaboración de alimentos para animales. Puede elaborar pellets de 2.5 y 4mm.

Dimensiones	**100 x 33 x 87 cm**
Peso	**101 kg**
Voltage	**220 V**
Consumo de Energía	**4.5 kw**
Capacidad	**200 kg / h**

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA
DAVETSA

LÁMPARA CALENTADORA INFRARROJA

Las bombillas infrarrojas también se denominan lámparas de calefacción por infrarrojos, que se refieren principalmente a lámparas cuya principal función se encuentra en el espectro infrarrojo. Puede proporcionar radiación de energía controlable y se puede utilizar para calentar, por lo tanto, se usa ampliamente en diversas industriasl.

VENTAJAS:

- Calienta más uniformemente, una vida más larga.
- Impermeable, anti-exposición y anti-vibración.
- Vida útil promedio de 6 meses de uso continuo.

Cuadro de soporte:

(Alambre de niquel puro + varilla de tungsteno + alambre de núcleo de cobre de múltiples hebras que exceden el estándar, (alambre de níquel puro).

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA DAVETSA

COMEDERO SECO - HÚMEDO

Utilizado para cerdos de engorde, lechones de destete y engorde. Chapa inferior de acero inoxidable 304, barril de HDPE, marco galvanizado. La capacidad es de 100 litros.

CARACTERÍSTICAS

- Cada comedero puede alimentar hasta 50 cerdos
- Con 19 equipo de control de descarga de alimento, se pueden ajustar con precisión de acuerdo con la alimentación del cerdo.
- Dispositivo de descarga de alimentación con rotación de 360 grados, lo que garantiza una alimentación fluida.

El diseño de comedero garantiza un efecto óptimo de alimentación y bebida, minimiza el desperdicio de alimento.

- El mezclador en el barril puede hacer que la alimentación caiga sin problemas.
- Estructura de marco exterior estable, fácil limpieza.

VENTAJAS

- Comer y beber en el mismo comedero.
- Asegurar una alimentación y bebida razonables.
- Fácil control
- Sin desperdicio, .ahorro de costos.
- Tolva de PVC espesante, gran capacidad.
- Es conveniente para la limpieza.

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA DAVETSA

CALENTADOR DE GAS CATALÍTICO INFRARROJO PARA CRIADERO

- Este calentador utiliza tecnología de combustión catalíticaa, tiene una mayor capacidad de conversión de calor.
- Bajo el mismo consumo de aire, libera más calor y produce menos gas residual.
- Material Exterior: Aluminio resistente al calor, la luz y la oxidación.
- Superficie de combustión: paneles de panal de cordierita de alta calidad con revestimiento de catalizador.

CARACTERÍSTICAS

- Económico y ahorro de energía con la misma potencia, nuestro calentador ahorra entre un 30% y un 60% de costo que el calentador eléctrico.
- Protección del medio ambiente
- Alta eficiencia, tasa de conversión térmica.
- Modelos compatibles con termostato para mantener la temperatura constante de la habitación automáticamente cuando se usa el termostato.
- Dispositivo de protección contra incendios, cuando se produce el apagado, la válvula cierra automáticamente el gas para evitar fugas de gas.
- Modelos compatibles con biogás y ajuste de la llama.
- Área de radiación suspendida del suelo a 0.9 ´1.5 m de área de radiación de 10 - 20 metros cuadrados que calientan 600 - 1500 pollos.
- Silencioso, ligero y compacto.

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA
DAVETSA

COMEDERO W/D GS100

Este nuevo comedero, se usa hoy día en todo el mundo, debido a sus numerosas ventajas como el incremento de peso diario en el animal y su ganancia, debido a poco desperdicio.

El diseño y la funcionalidad del nuevo GS 100 W/D Feeder
Está basado en más de 25 años de experiencia de los inventores daneses y se ha mejorado su diseño añadiendo otros elementos.

- Bandeja/ comedero
- Tolva / tapa
- Unidad de dosificacion
- Sistema de bebederos
- Nivelador de alimento

INSTALACIÓN

El comedero no necesita pletinas de piso para su instalación. Su propia estructura puede sujetarse a una valla metálica, de PVC o fijarse firmemente en el piso, ofrecemos elementos de fijación en caso de que los necesiten en sus instalaciones.

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA
DAVETSA

COMEDERO DESTETE 5 BOCAS

VENTAJAS

- Ahorro de alimentación, reduce el costo
- Para recoger la higiene de los alimentos, reduce el riesgo de enfermedades infecciosas.
- Acortar el ciclo de reproducción, ventas por adelantado
- Alimentación automática, ahorro de mano de obra
- La superficie del alimentador es suave, no daña la boca del cerdo.

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA
DAVETSA

JAULAS GESTACIÓN



DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA
DAVETSA

LÁMPARA DE CALEFACCIÓN

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA
DAVETSA

SUJETADOR DE JAULA A SLAT

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA
DAVETSA

PIGGLET FEEDER

VENTAJAS

- Material excelente, construcción resistente, no lastima la boca de cerdo.
- Producto con tapa, limpio e higiénico.
- La velocidad de corte se puede ajustar libremente, ahorrando materiales y siendo más conveniente.
- Diseño de gancho para una fácil fijación.
- La capacidad del comedero es grande, lo que puede satisfacer las necesidades de seis lechones al mismo tiempo.

*Material: Polipropileno.
* Dimensiones: 44 x 42.5 x 42.5 cm.
* Peso: 3.6 kg
* Color: Naranja
* Capacidad: 15 kg

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA
DAVETSA

RACKS DE CASTRACIÓN

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA
DAVETSA

ARETES DE IDENTIFICACIÓN

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA
DAVETSA

LÁMPARAS





DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA
DAVETSA

ENGORDE Y LECHON

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA
DAVETSA

BEBEDEROS DE MADRES Y ENGORDE

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA
DAVETSA

COMEDEROS



DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA
DAVETSA

COMEDEROS DE MATERNIDAD

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA
DAVETSA

COMEDEROS EN TOLVA

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA
DAVETSA

COMEDEROS DE LECHON DE PLÁSTICO VIRGEN

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA
DAVETSA

COMEDEROS DE LECHON DE ACERO INOXIDABLE

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA
DAVETSA

SUJETADOR DE CERDOS

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA
DAVETSA

BISTURÍ

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA
DAVETSA

JERINGAS

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA
DAVETSA

AGUJAS

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA
DAVETSA

CRAYONES CON ROSCA DE CERA

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA
DAVETSA

ARETEADOR

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA
DAVETSA

BOLSA DE RECOLECCIÓN CON FILTRO

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA
DAVETSA

JAULA DE MATERNIDAD

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA
DAVETSA

DESCOLADORA DE GAS



DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA
DAVETSA

AGUJAS DESECHABLES

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA
DAVETSA

DESCOLADORA ELÉCTRICA

DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA
DAVETSA