



DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA

 **DAVETSA**

Ganado



2022 Catálogo DE PRODUCTOS

INDICE

DAVETSA.....03

INJECTABLE

TNT Vetsa.....	04
Amoxifluvetza G.....	05
Ivovetza 3.5 L.A. 122.....	06
Dexavetza.....	07

SOLUCION ORAL

Coccivetsa.....	08
-----------------	----

LABORATORIO MEDIVAC.....09

INJECTABLE

Parvoflyn.....	10
----------------	----

ORAL

Canavet.....	11
Engordabol.....	12

LABORATORIO ZOTAL.....13

Sanitas forte vet.....	14
Sanitasneozital.....	15
Previo quat.....	16
Previo saludine.....	17
Diazipol G.....	18
Arpon Actisan.....	19

VET SCIENCE.....20

INJECTABLES

Adevet.....	21
Adevet + Fósforo.....	22
EnroVet Iny 10%.....	23
FluniVet Iny 50%.....	24
GentaVet Iny 100.....	25

IverVet Iny 1%.....	26
PhosVet B12.....	27
3-Streptopen G.....	28
Hierro-Forte.....	29
Diclón VS.....	30
Cetfiovet Iny 50.....	31
Levamivet B12.....	32
Vitavet Selenio + E.....	33
Oxivet Iny 10%.....	34
Tylogen VS.....	35
Tilmiflor Expecto Plus.....	36
Oxitocin Iny 20.....	37
Dipiron VS.....	38

SOLUCION ORAL

Albendavet 15%.....	39
---------------------	----

SANFER.....40

INJECTABLE

Amoxidex.....	41
---------------	----

OTROS EQUIPOS.....42

Ordeñadora doble portatil.....	43
Aretes de identificación.....	44
Bisturí.....	45
Jeringa.....	46
Agujas.....	47
Crayones con rosca de cera.....	48
Areteador.....	49
Agujas Desechables.....	50



DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA

 **DAVETSA**



DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA

 **DAVETSA**

TNT VETSA

Vitamínico reconstituyente y estimulante metabólico a base de fosforo orgánico.

Fórmula:

Cada 100 ml contiene:

Tiamina HCl	20 mg
Riboflavina 5 fosfato	10 mg
Nicotinamida	150 mg
Piridoxina HCl	20 mg
Cianocobalamina (Vitamina B12)	5 mg
Fósforo	1 g
Dextrosa anhidra	10 g
Cloruro de sodio	20 mg
Cloruro de potasio	20 mg
Borogluconato de magnesio	6 g
Borogluconato de calcio	25 g
Vehículo, c.b.p.	100.0 ml

INDICACIONES:

TNT-VETSA, es un suero energético y reconstituyente, indicado principalmente para el tratamiento y prevención de las deshidrataciones ocasionadas por vómito, diarrea, fiebre o trabajo en exceso, así como coadyuvante en el tratamiento de enfermedades infecciosas, parasitarias y metabólicas.

DOSIS:

- Bovinos: 500 mL
- Equinos: 200 -250 mL
- Ovinos, caprinos y porcinos: 50-125 mL
- Terneros, lechones y potros: 5-10 mL
- Pollos de engorda: 1-5 mL
- Caninos: 10 mL
- Felinos: 5 mL

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Intramuscular, subcutánea y endovenosa lenta.



AMOXIFLUVETSA G

Antibiótico de amplio espectro más antiinflamatorio

Fórmula:

Cada 1 mL contiene:

Amoxicilina trihidratada.....	150.0 mg
Gentamicina sulfato.....	40.0 mg
Flunixin meglumina.....	11.0 mg
Vehículo cbp.....	1.0 mL

INDICACIONES:


AMOXIFLUVETSA G, es un antibiótico de amplio espectro, indicado para el tratamiento de infecciones respiratorias y digestivas que cursan con dolor e inflamación en bovinos, equinos, porcinos, pollos de engorda, caninos y felinos causadas por bacterias sensibles a la combinación de amoxicilina y gentamicina.

DOSIS:

- **Bovinos:** 2 mL de Amoxifluvetsa G por cada 25 kg de peso vivo, cada 24 h, durante 3 días consecutivos.
- **Equinos:** 1 mL de Amoxifluvetsa G por cada 10 a 20 kg de peso vivo, cada 24 h, durante 3 días consecutivos.
- **Porcinos:** 1 mL de Amoxifluvetsa G por cada 20 kg de peso vivo, cada 24 h, durante 3 días consecutivos.
- **Pollos de engorda, caninos y felinos:** 1 mL de Amoxifluvetsa G por cada 10 kg de peso vivo, cada 24 horas durante 2 días consecutivos.

VÍAS DE ADMINISTRACIÓN:

Intramuscular.



IVOVETSA 3.5 L.A. 122

Vitamínico reconstituyente y estimulante metabólico
a base de fosforo orgánico.

Fórmula:

Cada 1 mL contiene:

Ivermectina.....35.0 mg

Vehículo, c.b.p.....1.0 mL

INDICACIONES:

IVOVETSA 3.5% L.A. 122 se indica para el control de diversos parásitos internos y externos, como: parásitos gastrointestinales (forma adulta y cuarto estadio larvario), incluyendo: *Ostertagia ostertagi* (incluso formas inhibidas), *Haemonchus contortus*, *H. placei*, *Trichostrongylus axei*, *Cooperia pectinata*, *C. oncophora*, *C. punctata*, *Bunostomum phlebotomum*. Parásitos pulmonares: *Dictyocaulus viviparus*. Control y tratamiento de ectoparásitos. Piojos: *Linognathus vituli*, *Haematopinus eurysternus*, *Solenopotes capillatus*. Ácaros de la sarna: *Psoroptes communis bovis*.

DOSIS:

Bovinos productores de carne: 1 ml por 50 kg de peso vivo (0.70 mg/Kg. de peso vivo).

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Subcutánea, en el área de la escápula o en el cuello.



DEXAVETSA 0.2%

Solución Inyectable / Antiinflamatorio

Fórmula:

Cada 1 ml contiene:

Dexametasona 21 fosfato.....	2.0 mg
Formaldehído.....	0.001 mL
Monopropilenglicol.....	0.4 mL
Agua Inyectable.....	0.6 mL

INDICACIONES:

DEXAVETSA 0.2% es un potente antiinflamatorio esterooidal de rápida y larga acción elaborado con dexametasona e indicado para el tratamiento de procesos inflamatorios musculares, articulares y en los síndromes alérgicos en bovinos, porcinos, equinos, caninos y felinos.

DOSIS:

Bovinos productores de carne y leche, equinos: 2.5 a 10 mL de DEXAVETSA 0.2% por animal, (equivalente de 5 a 20 mg de dexametasona por animal), como dosis única al día.

Porcinos: 0.5 a 5 mL de DEXAVETSA 0.2% por animal, (equivalente de 1 a 10 mg de dexametasona por animal), una vez al día.

Caninos y felinos: 0.125 a 0.5 mL de DEXAVETSA 0.2% por animal, (equivalente de 0.25 a 1 mg de dexametasona por animal), como única dosis al día.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Intramuscular e intravenosa



COCCIVETSA-1 AL 5%

Suspensión Oral / Coccidiostático

Fórmula:

Cada 100 mL contiene:

Toltrazuril.....	5.0 g
Carboximetilcelulosa (CMC).....	0.5 g
Dextrosa anhidra.....	1.0 g
Benzoato de sodio.....	0.2 g
Saborizante vainilla hidrosoluble.....	0.005 mL
Colorante amarillo.....	0.001 g
Agua purificada.....	97.5 g

INDICACIONES:

COCCIVETSA-1 al 5% es eficaz para el tratamiento de coccidiosis en porcinos y bovinos. COCCIVETSA-1 al 5% actúa contra todas las eimerias e isosporas, citoisosporas y algunos protozoarios, como son: *Isospora suis*, *Eimeria deblickei*, *E. polita*, *E. spinosa*, *E. porci*, *E. neodeblickei*, *E. perminuta*, *E. suis*, *E. bovis* y *E. zuernii* principalmente.

DOSIS:

- * **Porcinos:** 1 mL de COCCIVETSA-1 al 5% por cada 2.5 kg, equivalente a 20 mg de Toltrazuril por kg de peso vivo, dosis única.
- * **Bovinos:** 1 mL de COCCIVETSA-1 al 5% por cada 3 kg, equivalente a 15 mg de Toltrazuril por kg de peso vivo, dosis única.

VÍAS DE ADMINISTRACIÓN:

Oral. Directo en la cavidad oral del animal.



LABORATORIOS MEDIVAC



PARVOFLYN

Inyectable

LABORATORIOS MEDIVAC



Fórmula:

Cada mL contiene:

Tilosina tartrato.....	200 mg
Gentamicina sulfato.....	60 mg
Dipirona sódica.....	250 mg
Clorfeniramina maleato.....	10 mg
Vehículo CSP.....	1 mL

INDICACIONES:

Parvoflyn combina dos antibióticos para el tratamiento de infecciones del tracto gastrointestinal, respiratorio, auxiliar en el tratamiento de parvovirus canino.

DOSIS:

- * **Bovinos, porcinos, ovinos y caprino:** 1 cc por cada 20 kg.
- * **Caninos:** 1/2 ml 20 libras de peso, cada 24 horas de 3 – 5 días.
- * **Pollos y pollitas:** 0.2 cc/ml por cada kg/2lbs de peso.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Subcutánea o intramuscular



CANAVET

Suspensión Oral

Fórmula:

Cada 100 g contiene:

Caolin	10.0 g
Pectina	0.500 g
Sulfametosaxol	10.0 g
Trimetoprim	0.550 g
Neomicina	0.725 g
Homatoprima	0.010 g
Vehículo cbp	1 mL

INDICACIONES:

Antidiarréico oral en suspensión con tres antibióticos de alto espectro. Protector de la mucosa, solidifica las heces y absorbe las toxinas de alimento en mal estado. Contrarresta la diarrea infecciosa por E. Coli, salmonella spp streptococcus, auxiliar en la diarrea de parvovirus, en diarrea viral bovina IBR y TGI en cerdos.

DOSIS:

Perros y gatos 5 a 10 ml.

Ovinos y caprinos 10 a 30 ml.

Cerdos de 3 a 30 ml.

Vacunos y caballos de 60 a 120 ml.

Cada 12 horas, de 3 a 5 días.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral

LABORATORIOS MEDIVAC



ENGORDABOL

LABORATORIOS MEDIVAC



Anabólico en solución inyectable indicado en bovinos, equinos y porcinos.

Fórmula:

Cada ml contiene

Boldenona Undecilenato.....50 mg

INDICACIONES:

Coadyuvante en casos que se requiera promover la síntesis proteica en enfermedades de tipo debilitantes que produzcan pérdidas de peso, raquitismo o fracturas. Produce retención de nitrógeno, calcio, fósforo y potasio en balances negativos, contribuyendo a desarrollar una mayor masa muscular y un mejor crecimiento óseo.


Se utiliza como ayudante en tratamiento postquirúrgicos e intervenciones óseas luego de fracturas, para favorecer la formación del callo óseo. Estimula la formación de glóbulos rojos en procesos anémicos. Contribuye a aliviar los procesos de estrés ocasionado por destete precoz, castración o parasitismo.

DOSIS:

- * Bovinos, equinos, ovinos y porcinos: 0.5 ml / 45 kg de peso vivo, cada 2-4 semanas.
- * Caninos: 0.25 ml / 5 kg de peso vivo, cada 2-4 semanas.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Intramuscular profunda



ZOTAL®

— LABORATORIOS —



SANITAS FORTE VET



Composición:

Glutaraldehído	14%
Didecildimetilcloruro de amonio	10%
Excipiente c.s.p.	100%

INDICACIONES:

Desinfectante de última generación que combina dos principios activos que unidos ejercen una acción desinfectante de muy amplio espectro y a dosis de uso reducidas. Su excelente compatibilidad con todo tipo de materiales lo convierte en un producto versátil para la desinfección completa de naves, locales e instalaciones ganaderas así como para la desinfección de medios de transporte de ganado, clínicas veterinarias, Qaulas, etc.} y mataderos (área de estabulación de animales). También se encuentra autorizado su uso en la industria alimentaria.

DOSIFICACIÓN:

Rutinaria 0.2596
Normal 0.596
Estricta 1-296



SANITAS NEOZITAL



Composición:

Ácido paracético.....	5%
Peróxido de hidrogeno.....	25%
Excipiente c.s.p.....	100%

INDICACIONES:

Desinfectante de uso ganadero de amplio espectro que, gracias a su principio activo, el ácido peracético, proporciona una excelente capacidad de desinfección a concentraciones muy reducidas. Su fórmula es extremadamente potente, siendo capaz de eliminar bacterias, hongos y virus, pero a la vez completamente biodegradable, por lo que no genera residuos potencialmente peligrosos para el medio ambiente. Sus dosis de uso van del 0'3 al 196.

DOSIFICACIÓN:

Rutinaria 0.396

Normal 0.596

Estricta 1 96



PREVIO QUAT

Antibiotico expectorante -antipiretico -desinflamatorio / Oral



Composición:

Tensioactivos no iónicos.....	<5%
Tensioactivos anionicos.....	<5%
Tensioactivos anfotéricos.....	<5%
Agentes secuestrantes.....	<5%
Hidróxido sódico.....	5-15%
Alquibencil di metil cloruro.....	1%
Excipiente c.s.p.....	10%

INDICACIONES:

Detergente concentrado alcalino espumante sin cloro destinado a la limpieza de instalaciones ganaderas e industria alimentaria, con gran capacidad de arrastre sobre la materia orgánica adherida en las superficies a tratar. En aplicaciones de espuma usar equipo espumógeno a baja presión o lanza de espuma. al 2%

DOSIFICACIÓN:

Se usa entre el 0,5 y el 396



PREVIO SALUDINE



INDICACIONES:

Desinfectante de agua de bebida a base de peróxido de hidrógeno. especialmente indicado para aguas de consumo animal en explotaciones ganaderas. De alto poder oxidante y desinfectante. permite eliminar el biofilm e Impedir su reaparición controlando de esta forma la aparición de diarreas. Inhibidor de la incrustación. Controla la corrosión. Cumple la norma UNE 902 para tratamiento de aguas de consumo para peróxidos de hidrógeno.

DOSIFICACIÓN:

Diluir en agua una proporción de 30-50 ml / m³.

COMPOSICION:

Excipiente: c.s.p.....100%.

Peróxido de hidrógeno..... 50%



DIAZIPOL G

Insecticida Voladores y rastreros Insecticida líquido



Composición:

Cipermetrina.....	5%
Diazinón.....	7.5%
Excipiente c.s.p.....	100%

INDICACIONES:

DIAZIPOL G es un insecticida emulsionable que combina las propiedades de eficacia y volteo a bajas concentraciones propias de la Cipermetrina con el potente y prolongado efecto residual del diazinón, obteniéndose de este modo unos insuperables resultados en la desinsectación de todo tipo de instalaciones ganaderas. Su amplio espectro de acción incluye tanto a insectos voladores como insectos rastreros.

La combinación Cipermetrina/diazinón rinde unos espectaculares resultados en la eliminación de moscas al actuar ambos ingredientes de un modo potente, simultáneo y sostenido sobre el insecto.

DOSIS:

Se emplea diluido al 0,5-1 %.



ARPON ACTISAN

Insecticida Desinfectante



Composición:

Glutaraldehído.....	10%
Didecil dimetil cloruro de amonio.....	7.25%
Alquilbencil dimetil cloruro de amonio.....	15.92%
Cipermetrina.....	10%
Deltametrina.....	1.5%
Excipiente c.s.p.....	100%

INDICACIONES:

ARPON ACTISAN es un desinfectante e insecticida concentrado líquido emulsionable en agua. Combina 3 principios activos desinfectantes que unidos ejercen una acción desinfectante de muy amplio espectro que comprende bacterias, virus y hongos. Su acción insecticida se debe a los dos piretroides de su composición. Su excelente compatibilidad con todo tipo de materiales lo convierte en un producto versátil para la desinfección y desinsectación completa de instalaciones ganaderas, así como para el tratamiento de medios de transporte de ganado, clínicas veterinarias y mataderos.

DOSIFICACIÓN:

Se emplea diluido al 0,5-2%.



Vet Science[®]

LABORATORIOS



AdeVet

Vitamina A, D y E / Solución Inyectable

Fórmula:

Cada 5 mL contienen:

Vitamina A.....	500 000.0 UI
Vitamina D.....	75 000.0 UI
Vitamina E.....	50.0 UI
Vehículo, cbp.....	5.0 mL

INDICACIONES:

AdeVet está indicado para tratar la carencia de las vitaminas A, D3 y E en general. En hembras y machos reduce los problemas de infertilidad y favorece a los machos al inicio de la engorda. Puede administrarse, como coadyuvante en el tratamiento de enfermedades infecciosas, vacunaciones o desparasitaciones.

DOSIS:

- * **Bovinos (productores de carne y leche) y equinos:** Administrar de 3 a 6 mL de AdeVet.
- * **Porcinos, ovinos, caprinos, becerros y potros:** Administrar de 2 a 3 mL de AdeVet.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Intramuscular.



ADEVET + FÓSFORO

Solución Inyectable

Fórmula:

Cada 1 mL contiene:

Vitamina A.....	500 000.0 UI
Vitamina D.....	75 000.0 UI
Vitamina E.....	50.0 UI
Fósforo.....	1.56 mg
Vehículo c.b.p.....	1.0 mL.

INDICACIONES:

ADEVET + FÓSFORO está indicado para tratar la carencia de las vitaminas A, D3, E y Fósforo en general. En hembras y machos reduce los problemas de infertilidad y favorece a los machos al inicio de la engorda. Puede administrarse, como coadyuvante en el tratamiento de enfermedades infecciosas, vacunaciones o desparasitaciones.

DOSIS:

- ***Bovinos productores de carne:** Administrar de 4 a 6 mL de **ADEVET + FÓSFORO**.
- ***Porcinos, ovinos, caprinos y becerros:** Administrar de 2 a 3 mL de **ADEVET + FÓSFORO**.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Intramuscular.



EnroVet Iny 10%

Enrofloxacin / Solución Inyectable

Fórmula:

Cada 1 mL contiene:

Enrofloxacin.....100.0 mg

Vehículo, cbp.....1.0 mL

INDICACIONES:

ENROVET INY 10% es un antibiótico eficaz contra bacterias Gram (+): Staphylococcus spp, Streptococcus suis, Gram (-): Enterobacteriaceae, Pasteurella multocida, E. coli, Mannheimia haemolytica, Histophilus somni, Chlamydophila felis, Rickettsia, Actinobacillus pleuropneumoniae, Haemophilus parasuis, Klebsiella pneumoniae y Mycoplasma spp, indicado para el tratamiento de infecciones respiratorias y digestivas causadas por bacterias sensibles a la Enrofloxacin.

DOSIS:

* **Bovinos productores de carne, equinos, porcinos:** 2 mL por cada 40 kg de peso (equivalente a 5 mg de Enrofloxacin base por kg de peso vivo), cada 24 h, durante 3 a 5 días.

* **Caninos y felinos:** 0.25 mL por cada 5 kg de peso (equivalente a 5 mg de Enrofloxacin por kg de peso vivo) cada 24 h, durante 5 días.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Bovinos productores de carne: Subcutánea.

Equinos: Intravenosa e intramuscular.

Porcinos: Intramuscular.

Caninos: Intramuscular e intravenosa.

Felinos: Intramuscular.



FluniVet Iny 50

Flunixin meglumina / Solución Inyectable



Fórmula:

Cada 1 mL contienen:

Flunixin meglumina..... 50.0 mg

Vehículo, cbp..... 1.0 mL

INDICACIONES:

FluniVet Iny 50 está indicado en bovinos como coadyuvante en el tratamiento de mastitis aguda, trastornos respiratorios, procesos inflamatorios con alteraciones músculo esqueléticas, heridas y dolor postquirúrgico, dolor abdominal, diarreas neonatales en becerros, control de la pirexia asociada con el complejo respiratorio bovino (CRB) y endotoxemia, además se recomienda para la enfermedad respiratoria aguda, mastitis aguda por coliformes con choque endotóxico y dolor agudo (síndrome de la vaca caída). En equinos es auxiliar en trastornos músculo esqueléticos (miositis, tendinitis, sinovitis y artritis), dolor visceral (cólico), diarreas en potrillos, endotoxemia, enfermedad respiratoria aguda, colitis, laminitis, heridas y dolor post-quirúrgico. En porcinos ayuda en el tratamiento del síndrome MMA (Mastitis, Metritis, Agalactia), neumonía, artritis e inflamaciones de origen traumático. En caninos y felinos es eficaz para el tratamiento de la inflamación y el dolor asociado a padecimientos respiratorios, músculo esqueléticos y diferentes cuadros que cursan con dolor agudo.

DOSIS:

- * **Bovinos:** 4.4 mL de FluniVet Iny 50 por cada 100 kg de peso vivo, equivalente a 2.2 mg de Flunixin/kg. Repetir si es necesario a intervalos de 24 horas, pero no por más de 5 días.
- * **Equinos:** En dolores viscerales asociados al cólico, se recomienda de 0.22 a 0.44 mL de FluniVet Iny 50 por cada 10 kg de peso vivo, equivalente de 1.1 a 2.2 mg de Flunixin/kg, por vía intravenosa al iniciarse la signología. El tratamiento puede ser repetido 1 ó 2 veces si reaparecen los signos cada 24 horas. En inflamaciones y dolores asociados con alteraciones músculo esqueléticas, se recomienda 0.22 mL de FluniVet Iny 50 por cada 10 kg de peso vivo, equivalente a 1.1 mg de Flunixin/kg, por vía intramuscular o intravenosa, cada 24 horas, pero no por más de 5 días.
- * **Porcinos:** 1 a 2 mL de FluniVet Iny 50 por cada 45 kg de peso vivo, equivalente de 1.1 a 2.2 mg de Flunixin kg, cada 24 horas, durante 3 a 5 días continuos.
- * **Caninos y felinos:** 0.025 a 0.1 mL de FluniVet Iny 50 por cada 5 kg de peso vivo, equivalente de 0.25 a 1.1 mg de Flunixin/kg, cada 24 horas, durante 3 a 5 días continuos

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Bovinos, equinos, porcinos y caninos: intravenosa o intramuscular.

Felinos: subcutánea



GentaVet Iny 100

Gentamicina / Solución Inyectable

Fórmula:

Cada 1 mL contiene:

Gentamicina sulfato.....100.0 mg

Vehículo, cbp.....1.0 mL

INDICACIONES:

GENTAVET INY 100 es un antibiótico eficaz contra bacterias Gram (-): *E. coli*, *Klebsiella* spp, *Proteus* spp, *Pseudomonas aeruginosa*, *Salmonella* spp, *Enterobacter* spp, *Haemophilus* spp, *Serratia* spp, *Shigella* spp, *Actinobacillus* spp y *Mycoplasma* spp, indicado para el tratamiento de infecciones respiratorias y digestivas causadas por bacterias sensibles a la Gentamicina.

DOSIS:

- * **Bovinos productores de carne:** 4.4 a 6.6 mL por cada 100 kg de peso (equivalente de 4.4 a 6.6 mg de Gentamicina sulfato por kg de peso vivo), cada 24 h, durante 3 a 5 días.
- * **Equinos:** 6.6 mL por cada 100 kg de peso (equivalente a 6.6 mg de Gentamicina sulfato por kg de peso vivo), cada 24 h, durante 3 a 5 días
- * **Porcinos:** 1 mL por cada 20 kg de peso (equivalente a 5 mg de Gentamicina sulfato por kg de peso vivo), cada 24 h, durante 3 a 5 días.
- * **Caninos:** 0.45 a 0.70 mL por cada 5 kg de peso (equivalente de 9 a 14 mg de Gentamicina sulfato por kg de peso vivo), cada 24 h, durante 3 a 5 días.
- * **Felinos:** 0.25 a 0.40 mL por cada 5 kg de peso (equivalente de 5 a 8 mg de Gentamicina sulfato por kg de peso vivo), cada 24 h, durante 3 a 5 días.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Equinos, caninos y felinos: Intramuscular o intravenosa.

Bovinos productores de carne y porcinos: Intramuscular.



IverVet Iny 1%

Ivermectina / Solución Inyectable

Fórmula:

Cada 1 mL contiene:

Ivermectina.....10.0 mg

Vehículo, cbp..... 1.0 mL

INDICACIONES:

IVERVET INY 1% es una solución inyectable estéril, efectiva para el control y tratamiento contraparásitos internos en estados larvarios y adultos, así como los parásitos externos en bovinos, ovinos, porcinos, caprinos y caninos con una sola aplicación; presentando un amplio margen de seguridad en todas las especies antes mencionadas.

IVERVET INY 1% está indicado para el tratamiento contra los siguientes parásitos: Parásitos gastrointestinales: *Ascaris summa*, *Hyostrongylus rubidus*, *Oesophagostomum* spp, *Strongyloides ransomi* y *Ancylostoma* spp. Parásitos pulmonares: *Metastrongylus* spp. Parásitos del riñón: *Stephanurus dentatus*, *Trichuris suis*. Piojos: *Haematopinus suis*. Ácaros de la sarna: *Sarcoptes scabiei* var. *suis*, *Otodectes cynotis*, *Sarcoptes scabiei*, *Cheyletiella yasguri*, *Cheyletiella parasitovorax*, *Cheyletiella blakei*, *Pneumonyssus caninum*.

DOSIS:

- * **Bovinos productores de carne, ovinos y caprinos:** 1 mL por cada 50 kg de peso vivo (200 µg/kg de peso vivo), administración única.
- * **Porcinos:** 1 mL por cada 33 kg de peso vivo (300 µg/kg de peso vivo), administración única.
- * **Caninos:** 0.1 mL a 0.2 mL por cada 5 kg de peso vivo (200 a 400 µg/kg de peso vivo), administración única.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Subcutánea exclusivamente.



PhosVet B12

Ácido fosfonoso / Solución Inyectable

Fórmula:

Cada 1 mL contienen:

Ácido fosfonoso [1-(n-butilamino)-1-metiletil] (Butafosfán). 100.0 mg

Vitamina B12 (cianocobalamina)..... 50.0 µg

Vehículo, cbp..... 1.0 mL

INDICACIONES:

PhosVet B12 está indicado en el tratamiento de enfermedades crónicas y es eficaz en la protección del hígado, el metabolismo corporal y la formación de glóbulos rojos.

DOSIS:

- * **Bovinos productores de carne, bovinos productores de leche y equinos adultos:** 1000 a 2000 mg de butafosfán/kg + 0.5 a 1 mg de Vitamina B12/kg (equivalente de 10 a 20 mL).
 - En vacas en el postparto de 1 a 2 veces por semana, cada 2 a 3 días, hasta por 6 semanas.
 - En caballos deportivos, cada 2 a 3 días, hasta por 14 días.
- * **Potros y terneros:** 500 a 1200 mg de butafosfán/kg + 0.25 a 0.6 mg de Vitamina B12/kg (equivalente de 5 a 12 mL).
 - En terneros con desarrollo deficiente, hasta dos veces por semana.
- * **Ovinos y caprinos adultos:** 250 a 500 mg de butafosfán/kg + 0.125 a 0.25 mg de Vitamina B12/kg (equivalente de 2.5 a 5 mL).
 - Corderos y cabritos: 150 a 250 mg de butafosfán/kg + 0.075 a 0.125 mg de Vitamina B12/kg (equivalente de 1.5 a 2.5 mL).
 - En corderos y cabritos con desarrollo deficiente, hasta dos veces por semana.
- * **Porcinos:** 250 a 1000 mg de butafosfán/kg + 0.125 a 0.5 mg de Vitamina B12/kg (equivalente de 2.5 a 10 mL). En el síndrome MMA.
- * **Lechones:** 100 a 250 mg de butafosfán/kg + 0.05 a 0.125 mg de Vitamina B12/kg (equivalente de 1 a 2.5 mL), al destete y al inicio de la engorda.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Intramuscular, subcutánea o endovenosa. Puede mezclarse con suero glucosado o soluciones de calcio.



3-Streptopen G

Penicilina / Solución Inyectable

Fórmula:

Cada 1 mL contiene:

Penicilina G Potásica.....25 000 UI

Penicilina G Procaínica.....75 000 UI

Penicilina Benzatínica.....100 000 UI

Dihidroestreptomicina sulfato.....200 mg

Vehículo, c.b.p.....1 mL

INDICACIONES:

3-Streptopen G indicado para el tratamiento de procesos infecciosos causados por neumonías bacterianas, síndrome MMA (mastitis, metritis, agalactia), infecciones puerperales, clostridiasis, erisipela, heridas infectadas, tratamiento post-operatorio y enfermedades causadas por bacterias sensibles a las penicilinas en combinación con la dihidroestreptomicina.

DOSIS:

Bovinos (productores de carne y leche) y porcinos: 1 mL de 3-Streptopen G por cada 10 a 20 kg de peso vivo, equivalente a 10,000 UI/kg y 20,000 UI/kg de penicilinas, repetir a las 72 horas si es necesario.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Intramuscular profunda.



Hierro-Forte

Hierro dextrán / Solución Inyectable



Fórmula:

Cada 1 mL contiene:

Hierro dextrán.....	200 mg
Cobalto.....	10 mcg
Zinc.....	0.5 mg
Vitamina B12 (cianocobalamina).....	10 mcg
Vehículo c.b.p.....	1 mL

INDICACIONES:

Hierro-Forte es eficaz para el tratamiento y prevención de anemias generadas por deficiencias de hierro derivadas de desnutrición, parasitosis, convalecencias, hemorragias, estados que impliquen compromiso de glóbulos rojos y en animales de alto desempeño.

DOSIS:

- * **Bovinos:** 0.02 a 0.04 mg de hierro dextrán/kg, equivalentes de 1 a 2 mL de Hierro-Forte/100 kg de peso vivo, en bovinos con anemia, animales de alto desempeño o convalecientes.
- * **Beceros:** 5 mL de Hierro-Forte/animal, la primera, cuarta y sexta semana de edad.
- * **Ovinos y caprinos:** 0.05 mg de Hierro dextrán/kg, equivalente a 2.5 mL de Hierro-Forte/animal, entre la primera y tercera semana de edad.
- * **Porcinos (lechones):** 200 mg de hierro dextrán/lechón, equivalente a 1 mL de Hierro-Forte, el tercer día de nacidos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Intramuscular profunda.



Diclón VS

Diclofenaco sódico / Solución Inyectable

Fórmula:

Cada 1 mL contiene:

Diclofenaco sódico.....50 mg

Vehículo cbp.....1 mL

INDICACIONES:

Diclón VS está indicado como coadyuvante en enfermedades donde hay inflamación, fiebre y dolor.

DOSIS:

* **Bovinos y Porcinos:** 1-2.5 mg diclofenaco/kg, equivalentes de 1 a 2.5 ml de DICLON VS/50 kg de peso vivo, cada 24 horas, de 1 a 3 días continuos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Intramuscular profunda.



CEFTIO VET INY 50

Suspensión Oral

Fórmula:

Cada 1 ml contiene:

Certiofur clorhidrato 50.0 mg

Vehículo cbp 1.0 mL

INDICACIONES:

Es un antibiótico de amplio espectro con actividad bactericida. Indicado para el tratamiento de las siguientes enfermedades. En bovinos, para el tratamiento de infecciones respiratorias (fiebre de embarque y CRB), infecciones podales, infecciones de la glándula mamaria (Mastitis aguda y crónica), infecciones oculares, infecciones genitourinarias (fiebre puerpal y metritis aguda y crónica) y clostridiasis en porcinos, para el tratamiento de infecciones respiratorias (neumonía bacteriana), infecciones articulares (septicemia, poliartritis y poliserositis) e infecciones uterinas (síndrome MMA). En equinos, para el tratamiento de infecciones respiratorias y reproductivas. En caninos, felinos, ovinos y caprinos, para el tratamiento de enfermedades del tracto respiratorio.

DOSIS:

- **Bovinos productores de carne y productores de leche:** 1 a 2 mL por cada 50 kg de peso vivo (1.1 a 2.2 mg/kg de peso vivo), una vez al día durante 3 días.
- **Equinos, Ovinos y Caprinos:** 1 mL por cada 25 kg de peso vivo (2.2 mg/kg de peso vivo), una vez al día durante 3 a 5 días.
- **Porcinos:** 1.5 a 2.5 mL por cada 25 kg de peso vivo (3 a 5 mg/kg de peso vivo) una vez al día durante 3 a 5 días.
- **Caninos y felinos:** 0.2 a 0.4 mL por cada 5 kg de peso vivo (2.2 a 4.4 mg/kg de peso vivo), una vez al día durante 3 a 5 días.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Intramuscular o subcutánea.



LEVAM IVET 812

Solución Inyectable



Fórmula:

Cada 1 mL contiene:

Levamisol clorhidrato	120 mg
Vitamina B12 (cianocobalamina).....	100 mcg
Vehículo, cbp.....	1 mL

INDICACIONES:

Está indicado para el tratamiento de las parasitosis pulmonares y gastrointestinales de los bovinos, porcinos, ovinos y caprinos, eliminando formas adultas y larvarias. Adicionado con vitamina B12, que coadyuva en el tratamiento y recuperación.

DOSIS:

1 ml por cada 20 kg de peso vivo (equivalente a 6 mg de levamisol clorhidrato + 5 mcg de cianocobalamina/kg de p.v.). como aplicación única.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Intramuscular profunda.



VITAVET SELENIO+ E

Solución Inyectable

Fórmula:

Cada 1 ml contiene:

Selenita sódico	11,000 mcg
Vitamina E Tocoferol.	80,000 mcg
Fósforo	1,560 mcg
Vehículo cbp	1.0 ml

INDICACIONES:

Para la prevención y tratamiento de las deficiencias de vitamina E y selenio, fórmula adicionada con fósforo para mantenimiento. Es un potente antioxidante, evita la formación de peróxidos nocivos a las células. Previenen las enfermedades infecciosas y como auxiliar en profilaxis de algunas infecciones como síndrome miopático, disnea, síndrome de la vaca caída, enfermedad del músculo blanco, problemas locomotores crónicos, retención placentaria, esterilidad, abortos, partos prematuros y enteritis diarreica entre otros padecimientos.

DOSIS:

1 ml por cada 50 kilos de peso corporal.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Intramuscular o subcutánea.



OXIVET INY 10%

Solución Inyectable

Fórmula:

Cada 1 ml contiene:

Oxitetraciclina100.0 ml

Vehículo cbp1.0 ml

INDICACIONES:

En un antibiótico bacteriostático de amplio espectro, efectivo contra bacterias Gram positivas (Actinomyces spp, Bacillus anthracis, Clostridium spp, Corynebacterium spp, Erysipelothrix rhusiopathiae, Listeria spp, Staphylococcus spp, Streptococcus spp) y Gram negativas (Actinobacillus spp, Bordetella spp, Bruce/la spp, Campylobacter spp, Escherichia coli, Fusobacterium necrophorus, Haemophilus spp, Klebsiella spp, Leptospira spp, Oraxe//a bovis, Pasteurella spp, Salmonella spp, Shigella spp) Además actúa contra Chlamydia spp, Micoplasma spp, Anaplasma spp y Coxiella burnetti. Porcino, ovino, equino y caprino.

DOSIS:

En todas las especies de destino (blanco) administrar 1 ml de oxivet iny 10% tratan 10kg de peso, equivalente a 10 mg - 20 mg de oxitetraciclina por un kilogramo de peso.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Intramuscular o intravenosa.



TYLOGEN VS

Solución Inyectable

Fórmula:

Cada 1 ml contiene:

Tilosina tartrato	200 mg
Gentamicina sulfato	100 mg
Vehículo cbp	1.0 ml

INDICACIONES:

Tylogen VS es un antibiótico indicado para el tratamiento de infecciones respiratorias y digestivas causadas por bacterias sensibles a la combinación de tilosina con gentamicina.

DOSIS:

- Aves: 0.25 ml por kg de peso vivo, equivalente a 50 mg de tilosina tartrato + 25 mg de gentamicina sulfato/kg de peso vivo, cada 24 horas, durante 3 a 5 días continuos.
- Porcinos (hasta 3 días de nacidos): tratamiento de colibacilosis por E. coli y neumonías por Pasteurella spp: 0.25 mL de TyloGen VS por cada 5 kg de peso vivo, equivalente a 10 mg de Tilosina tartrato + 5 mg de Gentamicina sulfato/kg de peso vivo, cada 24 horas, durante 3 a 5 días continuos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Intramuscular



Tilmiflor Expecto Plus

Solución Inyectable



Fórmula:

Cada 1 ml contiene:

Tilmicosina fosfato	200.0	mg
Florfenicol.....	100.0	mg
Dipirona sódica.....	200.0	mg
Bromhexina clohidrato.....	3.0	mg

INDICACIONES:

Efectiva combinación de antibióticos de amplio espectro adicionada con un expectorante y antipirético. En los bovinos de carne, terneros y ganado lechero en periodo seco, está indicado en el tratamiento de enfermedades respiratorias, diarreas de terneros, pododermatitis, queratitis, infecciones del tracto genital e infecciones en general, causadas por: Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Klebsiella spp, Shigella spp, Histophilus somni, Corynebacterium pyogenes, E. coli, entre otras, así como las infecciones asociadas o complicadas por Mycoplasma spp. En porcinos es empleado en el tratamiento de enfermedades del tracto respiratorio como: pleuropneumonía, pasteurelosis, neumonía enzoótica, rinitis atrófica y en diarreas por E. coli e infecciones asociadas o complicadas con M. hyopneumoniae.

DOSIS:

- **Bovinos:** 1 ml de TILMIFLOR EXPECTOPLUS por cada 15 kg de peso vivo, realizar una segunda aplicación del producto a las 48 horas.
- **Porcinos:** 1 ml de TILMIFLOR EXPECTOPLUS por cada 30 kg de peso vivo, realizar una segunda aplicación del producto a las 48 horas

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Intramuscular profunda.



Oxitocin Iny 20

Solución Inyectable



Fórmula:

Cada 1 mL contiene:

Oxitocina sintética.....20.0 UI

Vehículo cbp.....1.0 mL

INDICACIONES:

Oxitocin Iny 20 está indicada para estimular la secreción de la leche, para tratar la agalactia, como tratamiento coadyuvante contra la mastitis y para provocar la contracción del útero en la inducción del parto. Además para potenciar las contracciones uterinas posparto y la expulsión de líquidos o membranas fetales.

DOSIS:

- * Bovinos productores de carne y leche: 40 a 60 UI (2 a 3 mL) cada 2 horas.
- * Equinos: 20 UI (1 mL), 1 a 3 veces al día.
- * Porcinos: 20 a 50 UI (1 a 2.5 mL).
- * Caninos: 1 a 5 UI (0.05 a 0.25 mL) cada 30-60 minutos.
- * Felinos: 5 UI (0.25 mL) una sola vez.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Intramuscular, intravenosa y subcutánea



Dipiron VS

Solución Inyectable

Fórmula:

Cada 1 mL contiene:

Dipirona sódica.....500.0 mg

Vehículo c.b.p.....1.0 mL

INDICACIONES:

Dipiron VS está indicada como coadyuvante en enfermedades donde hay inflamación, fiebre y dolor.

DOSIS:

- * **Bovinos y equinos:** 8 mL por cada 100 kg de peso vivo del animal.
- * **Porcinos, novillos y potros:** 5 a 15 mL ó 10 a 30 mL, según el peso del animal.
- * **Ovinos y caprinos:** 3 a 8 mL
- * **Caninos y felinos:** 2 a 5 mL

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Intramuscular profunda.
Subcutánea o intravenosa lenta.



ALBENDAVET 15%

Solución Inyectable

Fórmula:

Cada 1 ml contiene:

Albendazol	150.0 mg
Sulfato de cobalto	15.0 mg
Selenita de sodio	2,5.0 mg
Carbonato de zinc.	4.55 mg
Vehículo cbp	1.0 mg

INDICACIONES:

Está indicado para el tratamiento de parásitos gastrointestinales, pulmonares y hepáticos, sensibles a los componentes de la formulación.

ESPECIES:

Bovinos productores de leche y carne, ovinos y caprinos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral

DOSIS:

1ml por cada 20kg de peso corporal, equivalente a 7.5 mg de albendazol por kg de peso. Contra fasciola hepatica duplicar la dosis.



sanfer®



AMOXIDEX 100ML S/M

Antimicrobiano para el tratamiento y control de infecciones.

sanfer®

Fórmula:

Cada ml contiene:

Amoxicilina estéril en forma de trihidrato.....150mg
Acetato de dexametasona.....0.51 mg
Vehículo c.b.p.....1 ml

INDICACIONES:

Bovinos: Neumonías, diarreas en becerros, enteritis, septicemias, mastitis, metritis, pododermatitis, retención placentaria, pielonefritis y en la prevención de infecciones post-quirúrgicas.

Ovinos y caprinos: Neumonías, mastitis, metritis y pododermatitis.

Porcinos: Neumonías, metritis, síndrome MMA y enteritis.

Caninos: Infecciones secundarias asociadas con dermatitis, enteritis, otitis, leptospirosis, faringitis y tonsilitis; heridas post-quirúrgicas, infecciones respiratorias y urogenitales.

Felinos: Infecciones secundarias asociadas con virus respiratorios, enteritis, otitis e infecciones post-quirúrgicas.

VIA DE ADMINISTRACION:

Intramuscular o subcutánea

DOSIS:

15 mg/kg de peso vivo con base en la amoxicilina, equivalente a 1 ml/10 kg de peso vivo.



OTROS **EQUIPOS**

ORDEÑADORA DOBLE PORTÁTIL

Solución óptima para el ordeño de la pequeña y mediana explotación, por su funcionalidad, nuestra ordeñadoras están preparadas para un ordeño diario de alto rendimiento, garantizando la salud de la ubre y la calidad de la leche. Su diseño ergonómico y peso ajustado, las convierten en máquinas de fácil transporte con el mínimo esfuerzo. Su construcción es sólida y resistente, con pocos componentes que requieran mantenimiento.

Dimensiones	93 x 70 x 84 cm
Peso	95 kg
Voltage	110 V
Consumo de Energía	1500 w / 7.5 hp
Capacidad	25L x 2



ARETES DE IDENTIFICACIÓN



BISTURÍ



JERINGAS



AGUJAS



CRAYONES CON ROSCA DE CERA



ARETEADOR



AGUJAS DESECHABLES

